

10/527708

Rec'd PCT/PTO 11 MAR 2005

T/JPC3/11631

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

11.09.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年 9月13日

REC'D 30 OCT 2003

出願番号
Application Number: 特願2002-269091

[ST. 10/C]: [JP 2002-269091]


出願人
Applicant(s): 武田薬品工業株式会社

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年10月17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 B02304

【提出日】 平成14年 9月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A61K 38/00

【発明者】

 【住所又は居所】 茨城県つくば市並木4丁目16番地1 ガーデンヒルズ
 並木708号

 【氏名】 松井 英起

【発明者】

 【住所又は居所】 茨城県つくば市松代3丁目12番地1 武田松代レジデ
 ンス503号

 【氏名】 渡邊 知倫

【特許出願人】

 【識別番号】 000002934

 【氏名又は名称】 武田薬品工業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100114041

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 高橋 秀一

【選任した代理人】

 【識別番号】 100106323

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 関口 陽

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 005142

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9909276

【包括委任状番号】 0203423

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 神経変性疾患の予防・治療剤

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩の発現を調節する化合物またはその塩を含有してなる神経変性疾患の予防・治療剤。

【請求項 2】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩の遺伝子の発現を調節する化合物またはその塩を含有してなる神経変性疾患の予防・治療剤。

【請求項 3】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌクレオチドの塩基配列に相補的もしくは実質的に相補的な塩基配列またはその一部分を含有するアンチセンスポリヌクレオチド。

【請求項 4】 請求項 3 記載のアンチセンスポリヌクレオチドを含有してなる医薬。

【請求項 5】 神経変性疾患の予防・治療剤である請求項 4 記載の医薬。

【請求項 6】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドまたはその塩に対する抗体。

【請求項 7】 請求項 6 記載の抗体を含有してなる医薬。

【請求項 8】 神経変性疾患の予防・治療剤である請求項 7 記載の医薬。

【請求項 9】 請求項 6 記載の抗体を含有してなる診断薬。

【請求項 10】 神経変性疾患の診断薬である請求項 9 記載の診断薬。

【請求項 11】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌクレオチドを含有してなる神経変性疾患の診断薬。

【請求項 12】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同

一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩を用いることを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング方法。

【請求項 13】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩を含有することを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング用キット。

【請求項 14】 請求項 12 記載のスクリーニング方法または請求項 13 記載のスクリーニング用キットを用いて得られうる神経変性疾患の予防・治療剤。

【請求項 15】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌクレオチドを用いることを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング方法。

【請求項 16】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌクレオチドを含有することを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング用キット。

【請求項 17】 請求項 15 記載のスクリーニング方法または請求項 16 記載のスクリーニング用キットを用いて得られうる神経変性疾患の予防・治療剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、神経変性疾患の予防・治療剤および診断薬などに関する。

【0002】

【従来の技術】

アルツハイマー病 (Alzheimer' s disease) は進行性痴呆および認知能力の失調を伴う神経変性疾患の代表的なものであるが、これまでに効果的な治療法は見出されていない。アルツハイマー病は高齢化社会を迎えつつある現在において最も重要な疾患の一つであることは言うまでもなくその治療薬の開発は医療経済的にも極めて大きな意義を有する。

一方、ヒートショックやグルコース飢餓などタンパク質の生合成に影響を与える因子により小胞体に異常タンパク質が蓄積し、小胞体にストレスがかかることが知られている（小胞体ストレス）。生体に小胞体ストレスがかかると、シャペロン分子をはじめとする小胞体ストレス応答遺伝子群が発現し、異常タンパク質を修復または分解し、恒常性の維持を行なう。

近年、種々の神経変性疾患と小胞体ストレスとの関連性が重要視されるようになった。遺伝性のパーキンソン氏病である常染色体劣性遺伝性若年性パーキンソニズム（AR-JP）の病因遺伝子としてParkinが同定され（Nature, 392巻, 605-608頁, 1998年）、タンパク分解系に関与するユビキチンリガーゼであることが報告されている（Nat. Genet, 25巻, 302-305頁, 2000年）。さらにParkinの基質としてPael（Parkin associated endothelin receptor-like）受容体が同定された。この受容体は高次構造形成が困難なタンパク質で、このタンパク質の高次構造形成不全体は通常、速やかにparkinの作用で分解されるが、タンパク質分解系を抑制すると、異常Pael受容体が小胞体に蓄積し、その細胞は小胞体ストレスによる細胞死に陥ることが報告されている（非特許文献1 Cell, 105巻, 891-902頁, 2001年）。さらに家族性アルツハイマー病の原因遺伝子であるプレセニリン1の変異を有する細胞が小胞体ストレスに対して脆弱となること、および、小胞体ストレス応答に関与するIrelの欠失により β アミロイドの産生が上昇すること（非特許文献2 Biochem. Biophysic. Acta, 1536巻, 85-96頁, 2001年；非特許文献3 J. Biol. Chem., 276巻, 2108-2114頁, 2001年）が報告されている。

一方、遺伝子発現を網羅的に解析するために、cDNAまたはオリゴヌクレオチドを固定化したマイクロアレイ法が開発され、疾患特異的な遺伝子発現の変化を見出す技術が普及し、その有用性が確認されている。例えば、Affymetrix社のGeneChipシステムはがんなどの疾患の診断や創薬標的遺伝子の発見に多用されつつある。

Neuronal cell death inducible putative kinase (NIPK) は、ラット由来の細胞においてNGF飢餓やカルシウムイオノフォア刺激により発現上昇し、その翻訳領域にキナーゼドメインを有することが報告されている（非特許文献4 BBR

C, 258巻, 260-264頁, 1999年)。

【0003】

【非特許文献1】

Cell, 105巻, 891-902頁, 2001年

【非特許文献2】

Biochem. Biophysic. Acta, 1536巻, 85-96頁, 2001年

【非特許文献3】

J. Biol. Chem., 276巻, 2108-2114頁, 2001年

【非特許文献4】

Biochemical and Biophysical Research Communications, 258巻, 260-264頁, 1999年

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

安全で優れた神経変性疾患の予防・治療剤が求められている。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、小胞体ストレスを伴う神経細胞死誘導の時に発現が顕著に増加する遺伝子を見出し、この知見に基づいて、さらに検討を重ねた結果、本発明を完成するに至った。

【0006】

すなわち、本発明は、

(1) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩の発現を調節する化合物またはその塩を含有してなる神経変性疾患の予防・治療剤、

(2) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩の遺伝子の発現を調節する化合物またはその塩を含有してなる神経変性疾患の予防・治療剤、

(3) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミ

ノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌクレオチドの塩基配列に相補的もしくは実質的に相補的な塩基配列またはその一部分を含有するアンチセンスポリヌクレオチド、

(4) 上記(3)記載のアンチセンスポリヌクレオチドを含有してなる医薬、

(5) 神経変性疾患の予防・治療剤である上記(4)記載の医薬、

(6) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドまたはその塩に対する抗体、

(7) 上記(6)記載の抗体を含有してなる医薬、

(8) 神経変性疾患の予防・治療剤である上記(7)記載の医薬、

(9) 上記(6)記載の抗体を含有してなる診断薬、

(10) 神経変性疾患の診断薬である上記(9)記載の診断薬、

(11) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌクレオチドを含有してなる神経変性疾患の診断薬、

(12) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩を用いることを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング方法、

(13) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩を含有することを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング用キット、

(14) 上記(12)記載のスクリーニング方法または上記(13)記載のスクリーニング用キットを用いて得られうる神経変性疾患の予防・治療剤、

(15) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌクレオチドを用いることを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング方法、

(16) 配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質またはその部分ペプチドをコードするポリヌク

レオチドを含有することを特徴とする神経変性疾患の予防・治療剤のスクリーニング用キット、

(17) 上記(15)記載のスクリーニング方法または上記(16)記載のスクリーニング用キットを用いて得られうる神経変性疾患の予防・治療剤などを提供する。

【0007】

本発明で用いられる配列番号：1で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質（以下、本発明のタンパク質または本発明で用いられるタンパク質と称することもある）は、ヒトや温血動物（例えば、モルモット、ラット、マウス、ニワトリ、ウサギ、ブタ、ヒツジ、ウシ、サルなど）の細胞（例えば、肝細胞、脾細胞、神経細胞、グリア細胞、膵臓 β 細胞、骨髄細胞、メサングウム細胞、ランゲルハンス細胞、表皮細胞、上皮細胞、杯細胞、内皮細胞、平滑筋細胞、繊維芽細胞、繊維細胞、筋細胞、脂肪細胞、免疫細胞（例、マクロファージ、T細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞、肥満細胞、好中球、好塩基球、好酸球、単球）、巨核球、滑膜細胞、軟骨細胞、骨細胞、骨芽細胞、破骨細胞、乳腺細胞、肝細胞もしくは間質細胞、またはこれら細胞の前駆細胞、幹細胞もしくはガン細胞など）もしくはそれらの細胞が存在するあらゆる組織、例えば、脳、脳の各部位（例、嗅球、扁桃核、大脳基底核、海馬、視床、視床下部、大脳皮質、延髄、小脳）、脊髄、下垂体、胃、膵臓、腎臓、肝臓、生殖腺、甲状腺、胆のう、骨髄、副腎、皮膚、筋肉、肺、消化管（例、大腸、小腸）、血管、心臓、胸腺、脾臓、顎下腺、末梢血、前立腺、睾丸、卵巣、胎盤、子宮、骨、関節、骨格筋などに由来するタンパク質であってもよく、合成タンパク質であってもよい。

【0008】

配列番号：1で表されるアミノ酸配列と実質的に同一のアミノ酸配列としては、配列番号：1で表わされるアミノ酸配列と約50%以上、好ましくは約60%以上、さらに好ましくは約70%以上、より好ましくは約80%以上、特に好ましくは約90%以上、最も好ましくは約95%以上の相同性を有するアミノ酸配列などが挙げられる。

配列番号：1で表されるアミノ酸配列と実質的に同一のアミノ酸配列を含有するタンパク質としては、例えば、前記の配列番号：1で表されるアミノ酸配列と実質的に同一のアミノ酸配列を含有し、配列番号：1で表されるアミノ酸配列を含有するタンパク質と実質的に同質の活性を有するタンパク質などが好ましい。具体的には、配列番号：6、配列番号：8、配列番号：10、配列番号：12、配列番号：14、配列番号：16、配列番号：18または配列番号：20で表されるアミノ酸配列を含有するタンパク質などが挙げられる。

実質的に同質とは、それらの性質が性質的に（例、生理学的に、または薬理的に）同質であることを示す。したがって、上記活性が同等（例、約0.01～100倍、好ましくは約0.1～10倍、より好ましくは0.5～2倍）であることが好ましいが、これらの活性の程度、タンパク質の分子量などの量的要素は異なってもよい。

【0009】

また、本発明で用いられるタンパク質としては、例えば、（1）①配列番号：1で表されるアミノ酸配列中の1または2個以上（例えば1～100個程度、好ましくは1～30個程度、好ましくは1～10個程度、さらに好ましくは数（1～5）個）のアミノ酸が欠失したアミノ酸配列、②配列番号：1で表されるアミノ酸配列に1または2個以上（例えば1～100個程度、好ましくは1～30個程度、好ましくは1～10個程度、さらに好ましくは数（1～5）個）のアミノ酸が付加したアミノ酸配列、③配列番号：1で表されるアミノ酸配列に1または2個以上（例えば1～100個程度、好ましくは1～30個程度、好ましくは1～10個程度、さらに好ましくは数（1～5）個）のアミノ酸が挿入されたアミノ酸配列、④配列番号：1で表されるアミノ酸配列中の1または2個以上（例えば1～100個程度、好ましくは1～30個程度、好ましくは1～10個程度、さらに好ましくは数（1～5）個）のアミノ酸が他のアミノ酸で置換されたアミノ酸配列、または⑤それらを組み合わせたアミノ酸配列を含有するタンパク質などのいわゆるムテインも含まれる。

上記のようにアミノ酸配列が挿入、欠失または置換されている場合、その挿入、欠失または置換の位置としては、とくに限定されない。

【0010】

本明細書におけるタンパク質は、ペプチド標記の慣例に従って左端がN末端（アミノ末端）、右端がC末端（カルボキシル末端）である。配列番号：1で表わされるアミノ酸配列を含有するタンパク質をはじめとする、本発明で用いられるタンパク質は、C末端がカルボキシル基（ $-\text{COOH}$ ）、カルボキシレート（ $-\text{COO}^-$ ）、アミド（ $-\text{CONH}_2$ ）またはエステル（ $-\text{COOR}$ ）の何れであってもよい。

ここでエステルにおけるRとしては、例えば、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*n*-ブチルなどの C_{1-6} アルキル基、例えば、シクロペンチル、シクロヘキシルなどの C_{3-8} シクロアルキル基、例えば、フェニル、 α -ナフチルなどの C_{6-12} アリール基、例えば、ベンジル、フェネチルなどのフェニル- C_{1-2} アルキル基もしくは α -ナフチルメチルなどの α -ナフチル- C_{1-2} アルキル基などの C_{7-14} アラルキル基、ピバロイルオキシメチル基などが用いられる。

本発明で用いられるタンパク質がC末端以外にカルボキシル基（またはカルボキシレート）を有している場合、カルボキシル基がアミド化またはエステル化されているものも本発明で用いられるタンパク質に含まれる。この場合のエステルとしては、例えば上記したC末端のエステルなどが用いられる。

さらに、本発明で用いられるタンパク質には、N末端のアミノ酸残基（例、メチオニン残基）のアミノ基が保護基（例えば、ホルミル基、アセチル基などの C_{1-6} アルカノイルなどの C_{1-6} アシル基など）で保護されているもの、生体内で切断されて生成するN末端のグルタミン残基がピログルタミン酸化したもの、分子内のアミノ酸の側鎖上の置換基（例えば $-\text{OH}$ 、 $-\text{SH}$ 、アミノ基、イミダゾール基、インドール基、グアニジノ基など）が適当な保護基（例えば、ホルミル基、アセチル基などの C_{1-6} アルカノイル基などの C_{1-6} アシル基など）で保護されているもの、あるいは糖鎖が結合したいわゆる糖タンパク質などの複合タンパク質なども含まれる。

本発明で用いられるタンパク質の具体例としては、例えば、配列番号：1で表されるアミノ酸配列を含有するタンパク質などがあげられる。

【0011】

本発明で用いられるタンパク質の部分ペプチドとしては、前記した本発明で用いられるタンパク質の部分ペプチドであって、好ましくは、前記した本発明で用いられるタンパク質と同様の性質を有するものであればいずれのものでもよい。

具体的には、後述する本発明の抗体を調製する目的には、配列番号：1で表されるアミノ酸配列において第1～30番目、第250～280番目のアミノ酸配列を有するペプチドなどがあげられる。例えば、本発明で用いられるタンパク質の構成アミノ酸配列のうち少なくとも20個以上、好ましくは50個以上、さらに好ましくは70個以上、より好ましくは100個以上、最も好ましくは200個以上のアミノ酸配列を有するペプチドなどが用いられる。

また、本発明で用いられる部分ペプチドは、そのアミノ酸配列中の1または2個以上（好ましくは、1～10個程度、さらに好ましくは数（1～5）個）のアミノ酸が欠失し、または、そのアミノ酸配列に1または2個以上（好ましくは、1～20個程度、より好ましくは1～10個程度、さらに好ましくは数（1～5）個）のアミノ酸が付加し、または、そのアミノ酸配列に1または2個以上（好ましくは、1～20個程度、より好ましくは1～10個程度、さらに好ましくは数（1～5）個）のアミノ酸が挿入され、または、そのアミノ酸配列中の1または2個以上（好ましくは、1～10個程度、より好ましくは数個、さらに好ましくは1～5個程度）のアミノ酸が他のアミノ酸で置換されていてもよい。

【0012】

また、本発明で用いられる部分ペプチドはC末端がカルボキシル基（ -COOH ）、カルボキシレート（ -COO^- ）、アミド（ -CONH_2 ）またはエステル（ -COOR ）の何れであってもよい。

さらに、本発明で用いられる部分ペプチドには、前記した本発明で用いられるタンパク質と同様に、C末端以外にカルボキシル基（またはカルボキシレート）を有しているもの、N末端のアミノ酸残基（例、メチオニン残基）のアミノ基が保護基で保護されているもの、N端側が生体内で切断され生成したグルタミン残基がピログルタミン酸化したもの、分子内のアミノ酸の側鎖上の置換基が適当な保護基で保護されているもの、あるいは糖鎖が結合したいわゆる糖ペプチドなど

の複合ペプチドなども含まれる。

本発明で用いられる部分ペプチドは抗体作成のための抗原としても用いることができる。

【0013】

本発明で用いられるタンパク質または部分ペプチドの塩としては、生理学的に許容される酸（例、無機酸、有機酸）や塩基（例、アルカリ金属塩）などとの塩が用いられ、とりわけ生理学的に許容される酸付加塩が好ましい。このような塩としては、例えば、無機酸（例えば、塩酸、リン酸、臭化水素酸、硫酸）との塩、あるいは有機酸（例えば、酢酸、ギ酸、プロピオン酸、フマル酸、マレイン酸、コハク酸、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸、蔞酸、安息香酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸）との塩などが用いられる。

本発明で用いられるタンパク質もしくはその部分ペプチドまたはその塩は、前述したヒトや温血動物の細胞または組織から自体公知のタンパク質の精製方法によって製造することもできるし、タンパク質をコードするDNAを含有する形質転換体を培養することによっても製造することができる。また、後述のペプチド合成法に準じて製造することもできる。

ヒトや哺乳動物の組織または細胞から製造する場合、ヒトや哺乳動物の組織または細胞をホモジナイズした後、酸などで抽出を行ない、該抽出液を逆相クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィーなどのクロマトグラフィーを組み合わせることにより精製単離することができる。

【0014】

本発明で用いられるタンパク質もしくは部分ペプチドまたはその塩、またはそのアミド体の合成には、通常市販のタンパク質合成用樹脂を用いることができる。そのような樹脂としては、例えば、クロロメチル樹脂、ヒドロキシメチル樹脂、ベンズヒドリルアミン樹脂、アミノメチル樹脂、4-ベンジルオキシベンジルアルコール樹脂、4-メチルベンズヒドリルアミン樹脂、PAM樹脂、4-ヒドロキシメチルメチルフェニルアセトアミドメチル樹脂、ポリアクリルアミド樹脂、4-(2', 4'-ジメトキシフェニル-ヒドロキシメチル)フェノキシ樹脂、4-(2', 4'-ジメトキシフェニル-Fmocアミノエチル)フェノキシ

樹脂などを挙げるができる。このような樹脂を用い、 α -アミノ基と側鎖官能基を適当に保護したアミノ酸を、目的とするタンパク質の配列通りに、自体公知の各種縮合方法に従い、樹脂上で縮合させる。反応の最後に樹脂からタンパク質または部分ペプチドを切り出すと同時に各種保護基を除去し、さらに高希釈溶液中で分子内ジスルフィド結合形成反応を実施し、目的のタンパク質もしくは部分ペプチドまたはそれらのアミド体を取得する。

上記した保護アミノ酸の縮合に関しては、タンパク質合成に使用できる各種活性化試薬を用いることができるが、特に、カルボジイミド類がよい。カルボジイミド類としては、DCC、N, N'-ジイソプロピルカルボジイミド、N-エチル-N'-(3-ジメチルアミノプロリル)カルボジイミドなどが用いられる。これらによる活性化にはラセミ化抑制添加剤（例えば、HOBt, HOOBt）とともに保護アミノ酸を直接樹脂に添加するかまたは、対称酸無水物またはHOBtエステルあるいはHOOBtエステルとしてあらかじめ保護アミノ酸の活性化を行なった後に樹脂に添加することができる。

【0015】

保護アミノ酸の活性化や樹脂との縮合に用いられる溶媒としては、タンパク質縮合反応に使用しうることが知られている溶媒から適宜選択されうる。例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンなどの酸アミド類、塩化メチレン、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類、トリフルオロエタノールなどのアルコール類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、ピリジン、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、酢酸メチル、酢酸エチルなどのエステル類あるいはこれらの適宜の混合物などが用いられる。反応温度はタンパク質結合形成反応に使用され得ることが知られている範囲から適宜選択され、通常約-20℃～50℃の範囲から適宜選択される。活性化されたアミノ酸誘導体は通常1.5～4倍過剰で用いられる。ニンヒドリン反応を用いたテストの結果、縮合が不十分な場合には保護基の脱離を行なうことなく縮合反応を繰り返すことにより十分な縮合を行なうことができる。反応を繰り返しても十分な縮合が得られないときには、無水酢酸またはアセチルイミダゾールを用いて

未反応アミノ酸をアセチル化することによって、後の反応に影響を与えないようにすることができる。

【0016】

原料のアミノ基の保護基としては、例えば、Z、Boc、t-ベンチルオキシカルボニル、イソボルニルオキシカルボニル、4-メトキシベンジルオキシカルボニル、Cl-Z、Br-Z、アダマンチルオキシカルボニル、トリフルオロアセチル、フタロイル、ホルミル、2-ニトロフェニルスルフェニル、ジフェニルホスフィノチオイル、Fmocなどが用いられる。

カルボキシル基は、例えば、アルキルエステル化（例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、t-ブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル、2-アダマンチルなどの直鎖状、分枝状もしくは環状アルキルエステル化）、アラルキルエステル化（例えば、ベンジルエステル、4-ニトロベンジルエステル、4-メトキシベンジルエステル、4-クロロベンジルエステル、ベンズヒドリルエステル化）、フェナシルエステル化、ベンジルオキシカルボニルヒドラジド化、t-ブトキシカルボニルヒドラジド化、トリチルヒドラジド化などによって保護することができる。

セリンの水酸基は、例えば、エステル化またはエーテル化によって保護することができる。このエステル化に適する基としては、例えば、アセチル基などの低級（C₁-6）アルカノイル基、ベンゾイル基などのアロイル基、ベンジルオキシカルボニル基、エトキシカルボニル基などの炭酸から誘導される基などが用いられる。また、エーテル化に適する基としては、例えば、ベンジル基、テトラヒドロピラニル基、t-ブチル基などである。

チロシンのフェノール性水酸基の保護基としては、例えば、Bzl、Cl₂-Bzl、2-ニトロベンジル、Br-Z、t-ブチルなどが用いられる。

ヒスチジンのイミダゾールの保護基としては、例えば、Tos、4-メトキシ-2,3,6-トリメチルベンゼンスルホニル、DNP、ベンジルオキシメチル、Bum、Boc、Trt、Fmocなどが用いられる。

【0017】

原料のカルボキシル基の活性化されたものとしては、例えば、対応する酸無水

物、アジド、活性エステル〔アルコール（例えば、ペンタクロロフェノール、2, 4, 5-トリクロロフェノール、2, 4-ジニトロフェノール、シアノメチルアルコール、パラニトロフェノール、HONB、N-ヒドロキシスクシミド、N-ヒドロキシフタルイミド、HOBt）とのエステル〕などが用いられる。原料のアミノ基の活性化されたものとしては、例えば、対応するリン酸アミドが用いられる。

保護基の除去（脱離）方法としては、例えば、Pd-黒あるいはPd-炭素などの触媒の存在下での水素気流中での接触還元や、また、無水フッ化水素、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、トリフルオロ酢酸あるいはこれらの混合液などによる酸処理や、ジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミン、ピペリジン、ピペラジンなどによる塩基処理、また液体アンモニア中ナトリウムによる還元なども用いられる。上記酸処理による脱離反応は、一般に約-20℃～40℃の温度で行なわれるが、酸処理においては、例えば、アニソール、フェノール、チオアニソール、メタクレゾール、パラクレゾール、ジメチルスルフィド、1, 4-ブタンジチオール、1, 2-エタンジチオールなどのようなカチオン捕捉剤の添加が有効である。また、ヒスチジンのイミダゾール保護基として用いられる2, 4-ジニトロフェニル基はチオフェノール処理により除去され、トリプトファンのインドール保護基として用いられるホルミル基は上記の1, 2-エタンジチオール、1, 4-ブタンジチオールなどの存在下の酸処理による脱保護以外に、希水酸化ナトリウム溶液、希アンモニアなどによるアルカリ処理によっても除去される。

【0018】

原料の反応に関与すべきでない官能基の保護ならびに保護基、およびその保護基の脱離、反応に関与する官能基の活性化などは公知の基または公知の手段から適宜選択しうる。

タンパク質または部分ペプチドのアミド体を得る別の方法としては、例えば、まず、カルボキシ末端アミノ酸の α -カルボキシル基をアミド化して保護した後、アミノ基側にペプチド（タンパク質）鎖を所望の鎖長まで延ばした後、該ペプチド鎖のN末端の α -アミノ基の保護基のみを除いたタンパク質または部分ペプ

チドとC末端のカルボキシル基の保護基のみを除去したタンパク質または部分ペプチドとを製造し、これらのタンパク質またはペプチドを上記したような混合溶媒中で縮合させる。縮合反応の詳細については上記と同様である。縮合により得られた保護タンパク質またはペプチドを精製した後、上記方法によりすべての保護基を除去し、所望の粗タンパク質またはペプチドを得ることができる。この粗タンパク質またはペプチドは既知の各種精製手段を駆使して精製し、主要画分を凍結乾燥することで所望のタンパク質またはペプチドのアミド体を得ることができる。

タンパク質またはペプチドのエステル体を得るには、例えば、カルボキシ末端アミノ酸の α -カルボキシル基を所望のアルコール類と縮合しアミノ酸エステルとした後、タンパク質またはペプチドのアミド体と同様にして、所望のタンパク質またはペプチドのエステル体を得ることができる。

【0019】

本発明で用いられる部分ペプチドまたはそれらの塩は、自体公知のペプチドの合成法に従って、あるいは本発明で用いられるタンパク質を適当なペプチダーゼで切断することによって製造することができる。ペプチドの合成法としては、例えば、固相合成法、液相合成法のいずれによっても良い。すなわち、本発明で用いられる部分ペプチドを構成し得る部分ペプチドもしくはアミノ酸と残余部分とを縮合させ、生成物が保護基を有する場合は保護基を脱離することにより目的のペプチドを製造することができる。公知の縮合方法や保護基の脱離としては、例えば、以下の①～⑤に記載された方法が挙げられる。

①M. Bodanszky および M.A. Ondetti、ペプチド・シンセシス (Peptide Synthesis), Interscience Publishers, New York (1966年)

②SchroederおよびLuebke、ザ・ペプチド(The Peptide), Academic Press, New York (1965年)

③泉屋信夫他、ペプチド合成の基礎と実験、丸善(株) (1975年)

④矢島治明 および榊原俊平、生化学実験講座 1、タンパク質の化学IV、205、(1977年)

⑤矢島治明監修、続医薬品の開発、第14巻、ペプチド合成、広川書店

また、反応後は通常の精製法、例えば、溶媒抽出・蒸留・カラムクロマトグラフィー・液体クロマトグラフィー・再結晶などを組み合わせて本発明で用いられる部分ペプチドを精製単離することができる。上記方法で得られる部分ペプチドが遊離体である場合は、公知の方法あるいはそれに準じる方法によって適当な塩に変換することができるし、逆に塩で得られた場合は、公知の方法あるいはそれに準じる方法によって遊離体または他の塩に変換することができる。

【0020】

本発明で用いられるタンパク質をコードするポリヌクレオチドとしては、前述した本発明で用いられるタンパク質をコードする塩基配列を含有するものであればいかなるものであってもよい。好ましくはDNAである。DNAとしては、ゲノムDNA、ゲノムDNAライブラリー、前記した細胞・組織由来のcDNA、前記した細胞・組織由来のcDNAライブラリー、合成DNAのいずれでもよい。

ライブラリーに使用するベクターは、バクテリオファージ、プラスミド、コスミド、ファージミドなどいずれであってもよい。また、前記した細胞・組織よりtotal RNAまたはmRNA画分を調製したものをを用いて直接 Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (以下、RT-PCR法と略称する) によって増幅することもできる。

本発明で用いられるタンパク質をコードするDNAとしては、例えば、配列番号：2で表される塩基配列を含有するDNA、または配列番号：2で表される塩基配列とハイストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を含有し、前記した配列番号：1で表されるアミノ酸配列を含有するタンパク質と実質的に同質の性質を有するタンパク質をコードするDNAであれば何れのものでもよい。

【0021】

配列番号：2で表される塩基配列とハイストリンジェントな条件下でハイブリダイズできるDNAとしては、例えば、配列番号：2で表される塩基配列と約50%以上、好ましくは約60%以上、さらに好ましくは約70%以上、より好ましくは約80%以上、特に好ましくは約90%以上、最も好ましくは約95%以

上の相同性を有する塩基配列を含有するDNAなどが用いられる。具体的には、配列番号：5、配列番号：7、配列番号：9、配列番号：11、配列番号：13、配列番号：15、配列番号：17または配列番号：19で表される塩基配列を含有するDNAなどが挙げられる。

ハイブリダイゼーションは、自体公知の方法あるいはそれに準じる方法、例えば、モレキュラー・クローニング (Molecular Cloning) 2nd (J. Sambrook et al., Cold Spring Harbor Lab. Press, 1989) に記載の方法などに従って行なうことができる。また、市販のライブラリーを使用する場合、添付の使用説明書に記載の方法に従って行なうことができる。より好ましくは、ハイストリンジェントな条件に従って行なうことができる。

ハイストリンジェントな条件とは、例えば、ナトリウム濃度が約19～40 mM、好ましくは約19～20 mMで、温度が約50～70℃、好ましくは約60～65℃の条件を示す。特に、ナトリウム濃度が約19 mMで温度が約65℃の場合が最も好ましい。

より具体的には、配列番号：1で表されるアミノ酸配列を含有するタンパク質をコードするDNAとしては、配列番号：2で表される塩基配列を含有するDNAなどが用いられる。

【0022】

本発明で用いられる部分ペプチドをコードするポリヌクレオチド（例、DNA）としては、前述した本発明で用いられる部分ペプチドをコードする塩基配列を含有するものであればいかなるものであってもよい。また、ゲノムDNA、ゲノムDNAライブラリー、前記した細胞・組織由来のcDNA、前記した細胞・組織由来のcDNAライブラリー、合成DNAのいずれでもよい。

本発明で用いられる部分ペプチドをコードするDNAとしては、例えば、配列番号：2で表される塩基配列を含有するDNAの一部を有するDNA、または配列番号：2で表される塩基配列とハイストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を含有し、本発明のタンパク質と実質的に同質の活性を有するタンパク質をコードするDNAの一部を含有するDNAなどが用いられる。

配列番号：2で表される塩基配列とハイブリダイズできるDNAは、前記と同

意義を示す。

ハイブリダイゼーションの方法およびハイストリンジェントな条件は前記と同様のものが用いられる。

【0023】

本発明で用いられるタンパク質、部分ペプチド（以下、これらをコードするDNAのクローニングおよび発現の説明においては、これらを単に本発明のタンパク質と略記する場合がある）を完全にコードするDNAのクローニングの手段としては、本発明のタンパク質をコードする塩基配列の一部分を有する合成DNAプライマーを用いてPCR法によって増幅するか、または適当なベクターに組み込んだDNAを本発明のタンパク質の一部あるいは全領域をコードするDNA断片もしくは合成DNAを用いて標識したもののハイブリダイゼーションによって選別することができる。ハイブリダイゼーションの方法は、例えば、モレキュラー・クローニング (Molecular Cloning) 2nd (J. Sambrook et al., Cold Spring Harbor Lab. Press, 1989) に記載の方法などに従って行なうことができる。また、市販のライブラリーを使用する場合、添付の使用説明書に記載の方法に従って行なうことができる。

DNAの塩基配列の変換は、PCR、公知のキット、例えば、MutanTM-super Express Km（宝酒造（株））、MutanTM-K（宝酒造（株））等を用いて、ODA-LA PCR法、Gapped duplex法、Kunkel法等の自体公知の方法あるいはそれらに準じる方法に従って行なうことができる。

クローン化されたタンパク質をコードするDNAは目的によりそのまま、または所望により制限酵素で消化したり、リンカーを付加したりして使用することができる。該DNAはその5'末端側に翻訳開始コドンとしてのATGを有し、また3'末端側には翻訳終止コドンとしてのTAA、TGAまたはTAGを有していてもよい。これらの翻訳開始コドンや翻訳終止コドンは、適当な合成DNAアダプターを用いて付加することもできる。

本発明のタンパク質の発現ベクターは、例えば、（イ）本発明のタンパク質をコードするDNAから目的とするDNA断片を切り出し、（ロ）該DNA断片を適当な発現ベクター中のプロモーターの下流に連結することにより製造すること

ができる。

【0024】

ベクターとしては、大腸菌由来のプラスミド（例、pBR322、pBR325、pUC12、pUC13）、枯草菌由来のプラスミド（例、pUB110、pTP5、pC194）、酵母由来プラスミド（例、pSH19、pSH15）、 λ ファージなどのバクテリオファージ、レトロウイルス、ワクシニアウイルス、バキュロウイルスなどの動物ウイルスなどの他、pA1-11、pXT1、pRc/CMV、pRc/RSV、pcDNA1/Neoなどが用いられる。

本発明で用いられるプロモーターとしては、遺伝子の発現に用いる宿主に対応して適切なプロモーターであればいかなるものでもよい。例えば、動物細胞を宿主として用いる場合は、SR α プロモーター、SV40プロモーター、LTRプロモーター、CMVプロモーター、HSV-TKプロモーターなどが挙げられる。

これらのうち、CMV（サイトメガロウイルス）プロモーター、SR α プロモーターなどを用いるのが好ましい。宿主がエシェリヒア属菌である場合は、trpプロモーター、lacプロモーター、recAプロモーター、 λ PLプロモーター、lppプロモーター、T7プロモーターなどが、宿主がバチルス属菌である場合は、SPO1プロモーター、SPO2プロモーター、penPプロモーターなど、宿主が酵母である場合は、PHO5プロモーター、PGKプロモーター、GAPプロモーター、ADHプロモーターなどが好ましい。宿主が昆虫細胞である場合は、ポリヘドリンプロモーター、P10プロモーターなどが好ましい。

【0025】

発現ベクターには、以上の他に、所望によりエンハンサー、スプライシングシグナル、ポリA付加シグナル、選択マーカー、SV40複製オリジン（以下、SV40oriと略称する場合がある）などを含有しているものを用いることができる。選択マーカーとしては、例えば、ジヒドロ葉酸還元酵素（以下、dhfrと略称する場合がある）遺伝子〔メソトレキセート（MTX）耐性〕、アンピシリン耐性遺伝子（以下、Amp^rと略称する場合がある）、ネオマイシン耐性遺伝子（以下、Neo^rと略称する場合がある、G418耐性）等が挙げられる。

特に、d h f r 遺伝子欠損チャイニーズハムスター細胞を用いて d h f r 遺伝子を選択マーカーとして使用する場合、目的遺伝子をチミジンを含まない培地によっても選択できる。

また、必要に応じて、宿主に合ったシグナル配列を、本発明のタンパク質のN末端側に付加する。宿主がエシェリヒア属菌である場合は、PhoA・シグナル配列、OmpA・シグナル配列などが、宿主がバチルス属菌である場合は、 α -アミラーゼ・シグナル配列、サブチリシン・シグナル配列などが、宿主が酵母である場合は、MF α ・シグナル配列、SUC2・シグナル配列など、宿主が動物細胞である場合には、インシュリン・シグナル配列、 α -インターフェロン・シグナル配列、抗体分子・シグナル配列などがそれぞれ利用できる。

このようにして構築された本発明のタンパク質をコードするDNAを含有するベクターを用いて、形質転換体を製造することができる。

【0026】

宿主としては、例えば、エシェリヒア属菌、バチルス属菌、酵母、昆虫細胞、昆虫、動物細胞などが用いられる。

エシェリヒア属菌の具体例としては、例えば、エシェリヒア・コリ (Escherichia coli) K12・DH1 [プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ザ・ユーエスエー (Proc. Natl. Acad. Sci. USA), 60巻, 160(1968)], JM103 [ヌクレック・アシッズ・リサーチ (Nucleic Acids Research), 9巻, 309(1981)], JA221 [ジャーナル・オブ・モレキュラー・バイオロジー (Journal of Molecular Biology), 120巻, 517(1978)], HB101 [ジャーナル・オブ・モレキュラー・バイオロジー, 41巻, 459(1969)], C600 [ジェネティックス (Genetics), 39巻, 440(1954)] などが用いられる。

バチルス属菌としては、例えば、バチルス・サブチルス (Bacillus subtilis) MI114 [ジーン, 24巻, 255(1983)], 207-21 [ジャーナル・オブ・バイオケミストリー (Journal of Biochemistry), 95巻, 87(1984)] などが用いられる。

酵母としては、例えば、サッカロマイセス セレビシエ (Saccharomyces cere

visiae) AH22, AH22R⁻, NA87-11A, DKD-5D, 20B-12、シズサッカロマイセス ポンベ (*Schizosaccharomyces pombe*) NCYC1913, NCYC2036、ピキア パストリス (*Pichia pastoris*) KM71などが用いられる。

【0027】

昆虫細胞としては、例えば、ウイルスがAcNPVの場合は、夜盗蛾の幼虫由来株化細胞 (*Spodoptera frugiperda* cell; Sf細胞)、*Trichoplusia ni*の中腸由来のMG1細胞、*Trichoplusia ni*の卵由来のHigh FiveTM細胞、*Mamestra brassicae*由来の細胞または*Estigmena acrea*由来の細胞などが用いられる。ウイルスがBmNPVの場合は、蚕由来株化細胞 (*Bombyx mori* N細胞; BmN細胞)などが用いられる。該Sf細胞としては、例えば、Sf9細胞 (ATCC CRL1711)、Sf21細胞 (以上、Vaughn, J.L.ら、イン・ヴィボ (In Vivo), 13, 213-217, (1977))などが用いられる。

昆虫としては、例えば、カイコの幼虫などが用いられる〔前田ら、ネイチャー (Nature), 315巻, 592(1985)〕。

動物細胞としては、例えば、サル細胞COS-7, Vero, チャイニーズハムスター細胞CHO (以下、CHO細胞と略記), dhfr遺伝子欠損チャイニーズハムスター細胞CHO (以下、CHO (dhfr⁻)細胞と略記), マウスL細胞, マウスAtT-20, マウスミエローマ細胞, マウスATDC5細胞, ラットGH3, ヒトFL細胞などが用いられる。

エシェリヒア属菌を形質転換するには、例えば、プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ザ・ユーエスエー (Proc. Natl. Acad. Sci. USA), 69巻, 2110(1972)やジーン (Gene), 17巻, 107(1982)などに記載の方法に従って行なうことができる。

【0028】

バチルス属菌を形質転換するには、例えば、モレキュラー・アンド・ジェネラル・ジェネティックス (Molecular & General Genetics), 168巻, 111(1979)などに記載の方法に従って行なうことができる。

酵母を形質転換するには、例えば、メソッズ・イン・エンザイモロジー (Meth

ods in Enzymology), 194巻, 182-187 (1991)、プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ・オブ・ザ・ユーエスエー (Proc. Natl. Acad. Sci. USA), 75巻, 1929 (1978) などに記載の方法に従って行なうことができる。

昆虫細胞または昆虫を形質転換するには、例えば、バイオ／テクノロジー (Bio/Technology), 6, 47-55 (1988) などに記載の方法に従って行なうことができる。

動物細胞を形質転換するには、例えば、細胞工学別冊 8 新細胞工学実験プロトコル, 263-267 (1995) (秀潤社発行)、ヴィロロジー (Virology), 52巻, 456 (1973) に記載の方法に従って行なうことができる。

このようにして、タンパク質をコードするDNAを含有する発現ベクターで形質転換された形質転換体を得ることができる。

宿主がエシェリヒア属菌、バチルス属菌である形質転換体を培養する際、培養に使用される培地としては液体培地が適当であり、その中には該形質転換体の生育に必要な炭素源、窒素源、無機物その他が含有せしめられる。炭素源としては、例えば、グルコース、デキストリン、可溶性澱粉、ショ糖など、窒素源としては、例えば、アンモニウム塩類、硝酸塩類、コーンスチープ・リカー、ペプトン、カゼイン、肉エキス、大豆粕、バレイショ抽出液などの無機または有機物質、無機物としては、例えば、塩化カルシウム、リン酸二水素ナトリウム、塩化マグネシウムなどが挙げられる。また、酵母エキス、ビタミン類、生長促進因子などを添加してもよい。培地のpHは約5~8が望ましい。

【0029】

エシェリヒア属菌を培養する際の培地としては、例えば、グルコース、カザミノ酸を含むM9培地〔ミラー (Miller), ジャーナル・オブ・エクスペリメンツ・イン・モレキュラー・ジェネティックス (Journal of Experiments in Molecular Genetics), 431-433, Cold Spring Harbor Laboratory, New York 1972〕が好ましい。ここに必要によりプロモーターを効率よく働かせるために、例えば、3β-インドリルアクリル酸のような薬剤を加えることができる。

宿主がエシェリヒア属菌の場合、培養は通常約15~43℃で約3~24時間

行ない、必要により、通気や攪拌を加えることもできる。

宿主がバチルス属菌の場合、培養は通常約 30～40℃で約 6～24 時間行ない、必要により通気や攪拌を加えることもできる。

宿主が酵母である形質転換体を培養する際、培地としては、例えば、バークホルダー (Burkholder) 最小培地 [Bostian, K. L. ら、プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシイズ・オブ・ザ・ユーエスエー (Proc. Natl. Acad. Sci. USA), 77 巻, 4505 (1980)] や 0.5 % カザミノ酸を含有する SD 培地 [Bitter, G. A. ら、プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシイズ・オブ・ザ・ユーエスエー (Proc. Natl. Acad. Sci. USA), 81 巻, 5330 (1984)] が挙げられる。培地の pH は約 5～8 に調整するのが好ましい。培養は通常約 20℃～35℃で約 24～72 時間行ない、必要に応じて通気や攪拌を加える。

宿主が昆虫細胞または昆虫である形質転換体を培養する際、培地としては、Grace's Insect Medium (Grace, T.C.C., ネイチャー (Nature), 195, 788 (1962)) に非動化した 10% ウシ血清等の添加物を適宜加えたものなどが用いられる。培地の pH は約 6.2～6.4 に調整するのが好ましい。培養は通常約 27℃で約 3～5 日間行ない、必要に応じて通気や攪拌を加える。

宿主が動物細胞である形質転換体を培養する際、培地としては、例えば、約 5～20% の胎児牛血清を含む MEM 培地 [サイエンス (Science), 122 巻, 501 (1952)], DMEM 培地 [ヴィロロジー (Virology), 8 巻, 396 (1959)], RPMI 1640 培地 [ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・メディカル・アソシエーション (The Journal of the American Medical Association) 199 巻, 519 (1967)], 199 培地 [プロシーディング・オブ・ザ・ソサイエティ・フォー・ザ・バイオロジカル・メディスン (Proceeding of the Society for the Biological Medicine), 73 巻, 1 (1950)] などが用いられる。pH は約 6～8 であるのが好ましい。培養は通常約 30℃～40℃で約 15～60 時間行ない、必要に応じて通気や攪拌を加える。

以上のようにして、形質転換体の細胞内、細胞膜または細胞外に本発明のタンパク質を生成せしめることができる。

【0030】

上記培養物から本発明のタンパク質を分離精製するには、例えば、下記の方法により行なうことができる。

本発明のタンパク質を培養菌体あるいは細胞から抽出するに際しては、培養後、公知の方法で菌体あるいは細胞を集め、これを適当な緩衝液に懸濁し、超音波、リゾチームおよび／または凍結融解などによって菌体あるいは細胞を破壊したのち、遠心分離やろ過によりタンパク質の粗抽出液を得る方法などが適宜用いられる。緩衝液の中に尿素や塩酸グアニジンなどの蛋白質変性剤や、トリトン X-100 TM などの界面活性剤が含まれていてもよい。培養液中にタンパク質が分泌される場合には、培養終了後、それ自体公知の方法で菌体あるいは細胞と上清とを分離し、上清を集める。

このようにして得られた培養上清、あるいは抽出液中に含まれるタンパク質の精製は、自体公知の分離・精製法を適切に組み合わせて行なうことができる。これらの公知の分離、精製法としては、塩析や溶媒沈澱法などの溶解度を利用する方法、透析法、限外ろ過法、ゲルろ過法、および SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法などの主として分子量の差を利用する方法、イオン交換クロマトグラフィーなどの荷電の差を利用する方法、アフィニティークロマトグラフィーなどの特異的親和性を利用する方法、逆相高速液体クロマトグラフィーなどの疎水性の差を利用する方法、等電点電気泳動法などの等電点の差を利用する方法などが用いられる。

【0031】

かくして得られるタンパク質が遊離体で得られた場合には、自体公知の方法あるいはそれに準じる方法によって塩に変換することができ、逆に塩で得られた場合には自体公知の方法あるいはそれに準じる方法により、遊離体または他の塩に変換することができる。

なお、組換え体が産生するタンパク質を、精製前または精製後に適当な蛋白修飾酵素を作用させることにより、任意に修飾を加えたり、ポリペプチドを部分的に除去することもできる。蛋白修飾酵素としては、例えば、トリプシン、キモトリプシン、アルギニルエンドペプチダーゼ、プロテインキナーゼ、グリコシダー

ゼなどが用いられる。

かくして生成する本発明のタンパク質の存在は、特異抗体を用いたエンザイムイムノアッセイやウエスタンブロッティングなどにより測定することができる。

【0032】

本発明で用いられるタンパク質もしくは部分ペプチドまたはその塩に対する抗体は、本発明で用いられるタンパク質もしくは部分ペプチドまたはその塩を認識し得る抗体であれば、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体の何れであってもよい。

本発明で用いられるタンパク質もしくは部分ペプチドまたはその塩（以下、抗体の説明においては、これらを単に本発明のタンパク質と略記する場合がある）に対する抗体は、本発明のタンパク質を抗原として用い、自体公知の抗体または抗血清の製造法に従って製造することができる。

〔モノクローナル抗体の作製〕

（a）モノクローナル抗体産生細胞の作製

本発明のタンパク質は、温血動物に対して投与により抗体産生が可能な部位にそれ自体あるいは担体、希釈剤とともに投与される。投与に際して抗体産生能を高めるため、完全フロイントアジュバントや不完全フロイントアジュバントを投与してもよい。投与は通常2～6週毎に1回ずつ、計2～10回程度行われる。用いられる温血動物としては、例えば、サル、ウサギ、イヌ、モルモット、マウス、ラット、ヒツジ、ヤギ、ニワトリが挙げられるが、マウスおよびラットが好ましく用いられる。

モノクローナル抗体産生細胞の作製に際しては、抗原で免疫された温血動物、例えばマウスから抗体価の認められた個体を選択し最終免疫の2～5日後に脾臓またはリンパ節を採取し、それらに含まれる抗体産生細胞を同種または異種動物の骨髓腫細胞と融合させることにより、モノクローナル抗体産生ハイブリドーマを調製することができる。抗血清中の抗体価の測定は、例えば、後記の標識化タンパク質と抗血清とを反応させたのち、抗体に結合した標識剤の活性を測定することにより行なうことができる。融合操作は既知の方法、例えば、ケーラーとミルスタインの方法〔ネイチャー (Nature)、256、495 (1975)〕に従い実施するこ

とができる。融合促進剤としては、例えば、ポリエチレングリコール (PEG) やセンダイウイルスなどが挙げられるが、好ましくはPEGが用いられる。

【0033】

骨髓腫細胞としては、例えば、NS-1、P3U1、SP2/0、AP-1などの温血動物の骨髓腫細胞が挙げられるが、P3U1が好ましく用いられる。用いられる抗体産生細胞（脾臓細胞）数と骨髓腫細胞数との好ましい比率は1:1～20:1程度であり、PEG（好ましくはPEG1000～PEG6000）が10～80%程度の濃度で添加され、20～40℃、好ましくは30～37℃で1～10分間インキュベートすることにより効率よく細胞融合を実施できる。

モノクローナル抗体産生ハイブリドーマのスクリーニングには種々の方法が使用できるが、例えば、タンパク質抗原を直接あるいは担体とともに吸着させた固相（例、マイクロプレート）にハイブリドーマ培養上清を添加し、次に放射性物質や酵素などで標識した抗免疫グロブリン抗体（細胞融合に用いられる細胞がマウスの場合、抗マウス免疫グロブリン抗体が用いられる）またはプロテインAを加え、固相に結合したモノクローナル抗体を検出する方法、抗免疫グロブリン抗体またはプロテインAを吸着させた固相にハイブリドーマ培養上清を添加し、放射性物質や酵素などで標識したタンパク質を加え、固相に結合したモノクローナル抗体を検出する方法などが挙げられる。

モノクローナル抗体の選別は、自体公知あるいはそれに準じる方法に従って行なうことができる。通常HAT（ヒポキサンチン、アミノプテリン、チミジン）を添加した動物細胞用培地で行なうことができる。選別および育種用培地としては、ハイブリドーマが生育できるものならばどのような培地を用いても良い。例えば、1～20%、好ましくは10～20%の牛胎児血清を含むRPMI 1640培地、1～10%の牛胎児血清を含むGIT培地（和光純薬工業（株））あるいはハイブリドーマ培養用無血清培地（SFM-101、日水製薬（株））などを用いることができる。培養温度は、通常20～40℃、好ましくは約37℃である。培養時間は、通常5日～3週間、好ましくは1週間～2週間である。培養は、通常5%炭酸ガス下で行なうことができる。ハイブリドーマ培養上清の抗体価は、上記の抗血清中の抗体価の測定と同様にして測定できる。

【0034】

(b) モノクローナル抗体の精製

モノクローナル抗体の分離精製は、自体公知の方法、例えば、免疫グロブリンの分離精製法〔例、塩析法、アルコール沈殿法、等電点沈殿法、電気泳動法、イオン交換体（例、DEAE）による吸脱着法、超遠心法、ゲルろ過法、抗原結合固相あるいはプロテインAあるいはプロテインGなどの活性吸着剤により抗体のみを採取し、結合を解離させて抗体を得る特異的精製法〕に従って行なうことができる。

〔ポリクローナル抗体の作製〕

本発明のポリクローナル抗体は、それ自体公知あるいはそれに準じる方法に従って製造することができる。例えば、免疫抗原（タンパク質抗原）自体、あるいはそれとキャリアー蛋白質との複合体をつくり、上記のモノクローナル抗体の製造法と同様に温血動物に免疫を行ない、該免疫動物から本発明のタンパク質に対する抗体含有物を採取して、抗体の分離精製を行なうことにより製造することができる。

温血動物を免疫するために用いられる免疫抗原とキャリアー蛋白質との複合体に関し、キャリアー蛋白質の種類およびキャリアーとハプテンとの混合比は、キャリアーに架橋させて免疫したハプテンに対して抗体が効率良くできれば、どのようなものをどのような比率で架橋させてもよいが、例えば、ウシ血清アルブミンやウシサイログロブリン、ヘモシアニン等を重量比でハプテン1に対し、約0.1～20、好ましくは約1～5の割合でカプルさせる方法が用いられる。

また、ハプテンとキャリアーのカプリングには、種々の縮合剤を用いることができるが、グルタルアルデヒドやカルボジイミド、マレイミド活性エステル、チオール基、ジチオビリジル基を含有する活性エステル試薬等が用いられる。

縮合生成物は、温血動物に対して、抗体産生が可能な部位にそれ自体あるいは担体、希釈剤とともに投与される。投与に際して抗体産生能を高めるため、完全フロイントアジュバントや不完全フロイントアジュバントを投与してもよい。投与は、通常約2～6週毎に1回ずつ、計約3～10回程度行なわれる。

ポリクローナル抗体は、上記の方法で免疫された温血動物の血液、腹水など、

好ましくは血液から採取することができる。

抗血清中のポリクローナル抗体価の測定は、上記の抗血清中の抗体価の測定と同様にして測定できる。ポリクローナル抗体の分離精製は、上記のモノクローナル抗体の分離精製と同様の免疫グロブリンの分離精製法に従って行なうことができる。

【0035】

本発明で用いられるタンパク質または部分ペプチドをコードするポリヌクレオチド（例、DNA（以下、アンチセンスポリヌクレオチドの説明においては、これらのDNAを本発明のDNAと略記する場合がある））の塩基配列に相補的な、または実質的に相補的な塩基配列またはその一部を有するアンチセンスポリヌクレオチドとしては、本発明のDNAの塩基配列に相補的な、または実質的に相補的な塩基配列またはその一部を有し、該DNAの発現を抑制し得る作用を有するものであれば、いずれのアンチセンスポリヌクレオチドであってもよいが、アンチセンスDNAが好ましい。

本発明のDNAに実質的に相補的な塩基配列とは、例えば、本発明のDNAに相補的な塩基配列（すなわち、本発明のDNAの相補鎖）の全塩基配列あるいは部分塩基配列と約70%以上、好ましくは約80%以上、より好ましくは約90%以上、最も好ましくは約95%以上の相同性を有する塩基配列などが挙げられる。特に、本発明のDNAの相補鎖の全塩基配列うち、（イ）翻訳阻害を指向したアンチセンスポリヌクレオチドの場合は、本発明のタンパク質のN末端部位をコードする部分の塩基配列（例えば、開始コドン付近の塩基配列など）の相補鎖と約70%以上、好ましくは約80%以上、より好ましくは約90%以上、最も好ましくは約95%以上の相同性を有するアンチセンスポリヌクレオチドが、（ロ）RNase HによるRNA分解を指向するアンチセンスポリヌクレオチドの場合は、イントロンを含む本発明のDNAの全塩基配列の相補鎖と約70%以上、好ましくは約80%以上、より好ましくは約90%以上、最も好ましくは約95%以上の相同性を有するアンチセンスポリヌクレオチドがそれぞれ好適である。

具体的には、配列番号：2で表わされる塩基配列を含有するDNAの塩基配列

に相補的な、もしくは実質的に相補的な塩基配列、またはその一部分を有するアンチセンスポリヌクレオチド、好ましくは例えば、配列番号：2で表わされる塩基配列を含有するDNAの塩基配列に相補な塩基配列、またはその一部分を有するアンチセンスポリヌクレオチド（より好ましくは、配列番号：2で表わされる塩基配列を含有するDNAの塩基配列に相補な塩基配列、またはその一部分を有するアンチセンスポリヌクレオチド）などが挙げられる。

アンチセンスポリヌクレオチドは通常、10～40個程度、好ましくは15～30個程度の塩基から構成される。

ヌクレアーゼなどの加水分解酵素による分解を防ぐために、アンチセンスDNAを構成する各ヌクレオチドのりん酸残基（ホスフェート）は、例えば、ホスホロチオエート、メチルホスホネート、ホスホロジチオネートなどの化学修飾りん酸残基に置換されていてもよい。また、各ヌクレオチドの糖（デオキシリボース）は、2'-O-メチル化などの化学修飾糖構造に置換されていてもよいし、塩基部分（ピリミジン、プリン）も化学修飾を受けたものであってもよく、配列番号：2で表わされる塩基配列を有するDNAにハイブリダイズするものであればいずれのものでもよい。これらのアンチセンスポリヌクレオチドは、公知のDNA合成装置などを用いて製造することができる。

【0036】

本発明に従えば、本発明のタンパク質遺伝子の複製または発現を阻害することのできるアンチセンスポリヌクレオチドを、クローン化した、あるいは決定されたタンパク質をコードするDNAの塩基配列情報に基づき設計し、合成しうる。かかるヌクレオチド（核酸）は、本発明のタンパク質遺伝子のRNAとハイブリダイズすることができ、該RNAの合成または機能を阻害することができるか、あるいは本発明のタンパク質関連RNAとの相互作用を介して本発明のタンパク質遺伝子の発現を調節・制御することができる。本発明のタンパク質関連RNAの選択された配列に相補的なポリヌクレオチド、および本発明のタンパク質関連RNAと特異的にハイブリダイズすることができるポリヌクレオチドは、生体内および生体外で本発明のタンパク質遺伝子の発現を調節・制御するのに有用であり、また病気などの治療または診断に有用である。用語「対応する」とは、遺伝

子を含めたヌクレオチド、塩基配列または核酸の特定の配列に相同性を有するあるいは相補的であることを意味する。ヌクレオチド、塩基配列または核酸とペプチド（蛋白質）との間で「対応する」とは、ヌクレオチド（核酸）の配列またはその相補体から誘導される指令にあるペプチド（蛋白質）のアミノ酸を通常指している。タンパク質遺伝子の 5' 端ヘアピンループ、5' 端 6-ベースペア・リピート、5' 端非翻訳領域、ポリペプチド翻訳開始コドン、蛋白質コード領域、ORF 翻訳終止コドン、3' 端非翻訳領域、3' 端パリンドローム領域、および 3' 端ヘアピンループは好ましい対象領域として選択しうるが、タンパク質遺伝子内の如何なる領域も対象として選択しうる。

目的核酸と、対象領域の少なくとも一部に相補的なポリヌクレオチドとの関係は、対象物とハイブリダイズすることができるポリヌクレオチドとの関係は、「アンチセンス」であるということができる。アンチセンスポリヌクレオチドは、2-デオキシ-D-リボースを含有しているポリヌクレオチド、D-リボースを含有しているポリヌクレオチド、プリンまたはピリミジン塩基の N-グリコシドであるその他のタイプのポリヌクレオチド、あるいは非ヌクレオチド骨格を有するその他のポリマー（例えば、市販の蛋白質核酸および合成配列特異的な核酸ポリマー）または特殊な結合を含有するその他のポリマー（但し、該ポリマーは DNA や RNA 中に見出されるような塩基のペアリングや塩基の付着を許容する配置をもつヌクレオチドを含有する）などが挙げられる。それらは、2 本鎖 DNA、1 本鎖 DNA、2 本鎖 RNA、1 本鎖 RNA、さらに DNA:RNA ハイブリッドであることができ、さらに非修飾ポリヌクレオチド（または非修飾オリゴヌクレオチド）、さらには公知の修飾の付加されたもの、例えば当該分野で知られた標識のあるもの、キャップの付いたもの、メチル化されたもの、1 個以上の天然のヌクレオチドを類縁物で置換したもの、分子内ヌクレオチド修飾のされたもの、例えば非荷電結合（例えば、メチルホスホネート、ホスホトリエステル、ホスホルアミデート、カルバメートなど）を持つもの、電荷を有する結合または硫黄含有結合（例えば、ホスホロチオエート、ホスホロジチオエートなど）を持つもの、例えば蛋白質（ヌクレアーゼ、ヌクレアーゼ・インヒビター、トキシン、抗体、シグナルペプチド、ポリ-L-リジンなど）や糖（例えば、モノサッカラ

イドなど)などの側鎖基を有しているもの、インターカレント化合物(例えば、アクリジン、ソラレンなど)を持つもの、キレート化合物(例えば、金属、放射活性をもつ金属、ホウ素、酸化性の金属など)を含有するもの、アルキル化剤を含有するもの、修飾された結合を持つもの(例えば、 α アノマー型の核酸など)であってもよい。ここで「ヌクレオシド」、「ヌクレオチド」および「核酸」とは、プリンおよびピリミジン塩基を含有するのみでなく、修飾されたその他の複素環型塩基をもつようなものを含んでいて良い。こうした修飾物は、メチル化されたプリンおよびピリミジン、アシル化されたプリンおよびピリミジン、あるいはその他の複素環を含むものであってよい。修飾されたヌクレオチドおよび修飾されたヌクレオチドはまた糖部分が修飾されていてよく、例えば、1個以上の水酸基がハロゲンとか、脂肪族基などで置換されていたり、あるいはエーテル、アミンなどの官能基に変換されていてよい。

本発明のアンチセンスポリヌクレオチドは、RNA、DNA、あるいは修飾された核酸(RNA、DNA)である。修飾された核酸の具体例としては核酸の硫黄誘導体やチオホスフェート誘導体、そしてポリヌクレオシドアミドやオリゴヌクレオシドアミドの分解に抵抗性のものが挙げられるが、それに限定されるものではない。本発明のアンチセンス核酸は次のような方針で好ましく設計されうる。すなわち、細胞内でのアンチセンス核酸をより安定なものにする、アンチセンス核酸の細胞透過性をより高める、目標とするセンス鎖に対する親和性をより大きなものにする、そしてもし毒性があるならアンチセンス核酸の毒性をより小さなものにする。

こうして修飾は当該分野で数多く知られており、例えば J. Kawakami et al., Pharm Tech Japan, Vol. 8, pp.247, 1992; Vol. 8, pp.395, 1992; S. T. Crooke et al. ed., Antisense Research and Applications, CRC Press, 1993 などに開示がある。

本発明のアンチセンス核酸は、変化せしめられたり、修飾された糖、塩基、結合を含有していて良く、リポゾーム、ミクロスフェアのような特殊な形態で供与されたり、遺伝子治療により適用されたり、付加された形態で与えられることができる。こうして付加形態で用いられるものとしては、リン酸基骨格の電荷を

中和するように働くポリリジンのようなポリカチオン体、細胞膜との相互作用を高めたり、核酸の取込みを増大せしめるような脂質（例えば、ホスホリピド、コレステロールなど）といった疎水性のものが挙げられる。付加するに好ましい脂質としては、コレステロールやその誘導体（例えば、コレステリルクロホルメート、コール酸など）が挙げられる。こうしたものは、核酸の3' 端あるいは5' 端に付着させることができ、塩基、糖、分子内ヌクレオシド結合を介して付着させることができる。その他の基としては、核酸の3' 端あるいは5' 端に特異的に配置されたキャップ用の基で、エキソヌクレアーゼ、RNaseなどのヌクレアーゼによる分解を阻止するためのものが挙げられる。こうしたキャップ用の基としては、ポリエチレングリコール、テトラエチレングリコールなどのグリコールをはじめとした当該分野で知られた水酸基の保護基が挙げられるが、それに限定されるものではない。

アンチセンス核酸の阻害活性は、本発明の形質転換体、本発明の生体内や生体外の遺伝子発現系、あるいは本発明のタンパク質の生体内や生体外の翻訳系を用いて調べることができる。該核酸それ自体公知の各種の方法で細胞に適用できる。

【0037】

以下に、本発明のタンパク質もしくは部分ペプチドまたはその塩（以下、本発明のタンパク質と略記する場合がある）、本発明のタンパク質または部分ペプチドをコードするポリヌクレオチド（例、DNA（以下、本発明のDNAと略記する場合がある））、本発明のタンパク質もしくは部分ペプチドまたはその塩に対する抗体（以下、本発明の抗体と略記する場合がある）、および本発明のDNAのアンチセンスポリヌクレオチド（以下、本発明のアンチセンスポリヌクレオチドと略記する場合がある）の用途を説明する。

【0038】

本発明のタンパク質は、小胞体ストレスを伴う神経細胞死により発現が上昇するので、疾患マーカーとして利用することが出来る。すなわち、神経変性における早期診断、症状の重症度の判定、疾患進行の予測のためのマーカーとして有用である。よって、本発明のタンパク質をコードする遺伝子のアンチセンスポリヌ

クレオチド、本発明のタンパク質の活性を阻害する化合物もしくはその塩または本発明のタンパク質に対する抗体を含有する医薬は、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤として使用することができる。

【0039】

（1）疾病に対する医薬候補化合物のスクリーニング

本発明のタンパク質は小胞体ストレスを伴う神経細胞死により発現が上昇するので、本発明のタンパク質の活性を調節する化合物またはその塩は、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤として使用することができる。

したがって、本発明のタンパク質は、本発明のタンパク質の活性を調節する化合物またはその塩のスクリーニングのための試薬として有用である。

すなわち、本発明は、本発明のタンパク質を用いることを特徴とする本発明のタンパク質の活性を調節（促進または阻害）する化合物またはその塩のスクリーニング方法を提供する。

具体的には、（i）本発明のタンパク質の活性と、（ii）本発明のタンパク質と試験化合物の混合物の活性との比較をすることを特徴する本発明のタンパク質の活性を調節（促進または阻害）する化合物またはその塩のスクリーニング方法が用いられる。

上記の本発明のタンパク質は、本発明のタンパク質を産生する能力を有する細胞を培養することによって製造されたものなどが用いられる。さらには、前記細胞の培養液、その上清、細胞破碎物などを用いてもよい。

本発明のタンパク質を産生する能力を有する細胞としては、例えば、前述した

本発明のタンパク質をコードするDNAを含有するベクターで形質転換された宿主（形質転換体）が用いられる。宿主としては、例えば、COS7細胞、CHO細胞、HEK293細胞などの動物細胞が好ましく用いられる。該スクリーニングには、例えば、前述の方法で培養することによって、本発明のタンパク質を細胞外に分泌させる、または細胞内に発現させる形質転換体が好ましく用いられる。本発明のタンパク質を発現し得る細胞の培養方法は、前記した本発明の形質変換体の培養法と同様である。

試験化合物としては、例えばペプチド、タンパク質、非ペプチド性化合物、合成化合物、発酵生産物、細胞抽出液、植物抽出液、動物組織抽出液などがあげられる。

例えば、上記(ii)の場合における活性が上記(i)の場合に比べて、約20%以上、好ましくは30%以上、より好ましくは約50%以上上昇させる試験化合物を、本発明のタンパク質の活性を促進する化合物として、上記(ii)の場合における活性が上記(i)の場合に比べて、約20%以上、好ましくは30%以上、より好ましくは約50%以上減少させる試験化合物を本発明のタンパク質の活性を阻害する化合物として選択することができる。

【0040】

本発明のタンパク質の活性を促進する活性を有する化合物は、本発明のタンパク質の作用を増強するための安全で低毒性な医薬として有用である。

本発明のタンパク質の活性を阻害する活性を有する化合物は、本発明のタンパク質の生理活性を抑制するための安全で低毒性な医薬として有用である。

本発明のスクリーニング方法またはスクリーニング用キットを用いて得られる化合物またはその塩は、例えば、ペプチド、タンパク、非ペプチド性化合物、合成化合物、発酵生産物、細胞抽出液、植物抽出液、動物組織抽出液、血漿などから選ばれた化合物である。該化合物の塩としては、前記した本発明のペプチドの塩と同様のものが用いられる。

【0041】

さらに、本発明のタンパク質をコードする遺伝子も、小胞体ストレスを伴う神経細胞死誘導により発現が増加するので、本発明のタンパク質をコードする遺伝

子の発現をする化合物またはその塩は、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤として使用することができる。

したがって、本発明のポリヌクレオチド（例、DNA）は、本発明のタンパク質をコードする遺伝子の発現を調節する化合物またはその塩のスクリーニングのための試薬として有用である。

スクリーニング方法としては、(iii) 本発明のタンパク質を産生する能力を有する細胞を培養した場合と、(iv) 試験化合物の存在下、本発明で用いられるタンパク質を産生する能力を有する細胞を培養した場合との比較を行うことを特徴とするスクリーニング方法が挙げられる。

上記方法において、(iii) と (iv) の場合における、前記遺伝子の発現量（具体的には、本発明のタンパク質量または前記タンパク質をコードする mRNA 量）を測定して、比較する。

試験化合物および本発明のタンパク質を産生する能力を有する細胞としては、上記と同様のものが挙げられる。

タンパク質量の測定は、公知の方法、例えば、本発明のタンパク質を認識する抗体を用いて、細胞抽出液中などに存在する前記タンパク質を、ウェスタン解析、ELISA 法などの方法またはそれに準じる方法に従い測定することができる。

mRNA 量の測定は、公知の方法、例えば、プローブとして配列番号：2 またはその一部分を含有する核酸を用いるノーザンハイブリダイゼーション、あるいはプライマーとして配列番号：2 またはその一部分を含有する核酸を用いる PCR 法またはそれに準じる方法に従い測定することができる。

例えば、上記 (iv) の場合における遺伝子発現量を、上記 (iii) の場合に比べて、約 20% 以上、好ましくは 30% 以上、より好ましくは約 50% 以上上昇させる試験化合物を、本発明のタンパク質をコードする遺伝子の発現を促進する化合物として、約 20% 以上、好ましくは 30% 以上、より好ましくは約 50%

以上阻害する試験化合物を、本発明のタンパク質をコードする遺伝子の発現を抑制する化合物として選択することができる。

【0042】

本発明のスクリーニング用キットは、本発明で用いられるタンパク質もしくは部分ペプチドまたはその塩、または本発明で用いられるタンパク質もしくは部分ペプチドを産生する能力を有する細胞を含有するものである。

本発明のスクリーニング方法またはスクリーニング用キットを用いて得られる化合物またはその塩は、上記した試験化合物、例えば、ペプチド、タンパク、非ペプチド性化合物、合成化合物、発酵生産物、細胞抽出液、植物抽出液、動物組織抽出液、血漿などから選ばれた化合物またはその塩であり、本発明のタンパク質の活性（例、プロテアーゼ阻害活性またはプロコラーゲンC末端切断促進活性など）を調節する化合物またはその塩である。

該化合物の塩としては、前記した本発明のタンパク質の塩と同様のものが用いられる。

本発明のタンパク質の活性を調節する化合物またはその塩、および本発明のタンパク質をコードする遺伝子の発現を調節する化合物またはその塩はそれぞれ、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤として有用である。

本発明のスクリーニング方法またはスクリーニング用キットを用いて得られる化合物またはその塩を上述の予防・治療剤として使用する場合、常套手段に従って製剤化することができる。

【0043】

例えば、経口投与のための組成物としては、固体または液体の剤形、具体的には錠剤（糖衣錠、フィルムコーティング錠を含む）、丸剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤（ソフトカプセル剤を含む）、シロップ剤、乳剤、懸濁剤などがあげられる。かかる組成物は自体公知の方法によって製造され、製剤分野において通常用

いられる担体、希釈剤もしくは賦形剤を含有するものである。例えば、錠剤用の担体、賦形剤としては、乳糖、でんぷん、蔗糖、ステアリン酸マグネシウムなどが用いられる。

非経口投与のための組成物としては、例えば、注射剤、坐剤などが用いられ、注射剤は静脈注射剤、皮下注射剤、皮内注射剤、筋肉注射剤、点滴注射剤、関節内注射剤などの剤形を包含する。かかる注射剤は、自体公知の方法に従って、例えば、上記抗体またはその塩を通常注射剤に用いられる無菌の水性もしくは油性液に溶解、懸濁または乳化することによって調製する。注射用の水性液としては、例えば、生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助薬を含む等張液などが用いられ、適当な溶解補助剤、例えば、アルコール（例、エタノール）、ポリアルコール（例、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール）、非イオン界面活性剤〔例、ポリソルベート 80、HCO-50 (polyoxyethylene (50 mol) adduct of hydrogenated castor oil)〕などと併用してもよい。油性液としては、例えば、ゴマ油、大豆油などが用いられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジル、ベンジルアルコールなどを併用してもよい。調製された注射液は、通常、適当なアンプルに充填される。直腸投与に用いられる坐剤は、上記抗体またはその塩を通常の坐薬用基剤に混合することによって調製される。

【0044】

上記の経口用または非経口用医薬組成物は、活性成分の投与量に適合するような投薬単位の剤形に調製されることが好都合である。かかる投薬単位の剤形としては、錠剤、丸剤、カプセル剤、注射剤（アンプル）、坐剤などが例示され、それぞれの投薬単位剤形当たり通常 5～500 mg、とりわけ注射剤では 5～100 mg、その他の剤形では 10～250 mg の上記化合物が含有されていることが好ましい。

なお前記した各組成物は、上記化合物との配合により好ましくない相互作用を生じない限り他の活性成分を含有してもよい。

このようにして得られる製剤は安全で低毒性であるので、例えば、ヒトまたは温血動物（例えば、マウス、ラット、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ウマ、トリ、ネコ、イヌ、サル、チンパンジーなど）に対して経口的にまたは非経口的に投

与することができる。

該化合物またはその塩の投与量は、その作用、対象疾患、投与対象、投与ルートなどにより差異はあるが、例えば、アルツハイマー病の治療の目的で本発明のタンパク質の活性を調節する化合物またはその塩を経口投与する場合、一般的に成人（体重 60 kg として）においては、一日につき該化合物またはその塩を約 0.1～100 mg、好ましくは約 1.0～50 mg、より好ましくは約 1.0～20 mg 投与する。非経口的に投与する場合は、該化合物またはその塩の 1 回投与量は投与対象、対象疾患などによっても異なるが、例えば、アルツハイマー病の治療の目的で本発明のタンパク質の活性を調節する化合物またはその塩を注射剤の形で通常成人（体重 60 kg として）に投与する場合、一日につき該化合物またはその塩を約 0.01～30 mg 程度、好ましくは約 0.1～20 mg 程度、より好ましくは約 0.1～10 mg 程度を静脈注射により投与するのが好都合である。他の動物の場合も、体重 60 kg 当りに換算した量を投与することができる。

【0045】

（2）本発明のタンパク質、その部分ペプチドまたはその塩の定量

本発明のタンパク質に対する抗体（以下、本発明の抗体と略記する場合がある）は、本発明のタンパク質を特異的に認識することができるので、被検液中の本発明のタンパク質の定量、特にサンドイッチ免疫測定法による定量などに使用することができる。

すなわち、本発明は、

（i）本発明の抗体と、被検液および標識化された本発明のタンパク質とを競合的に反応させ、該抗体に結合した標識化された本発明のタンパク質の割合を測定することを特徴とする被検液中の本発明のタンパク質の定量法、および

（ii）被検液と担体上に不溶化した本発明の抗体および標識化された本発明の別の抗体とを同時あるいは連続的に反応させたのち、不溶化担体上の標識剤の活性を測定することを特徴とする被検液中の本発明のタンパク質の定量法を提供する。

上記（ii）の定量法においては、一方の抗体が本発明のタンパク質の N 端部を

認識する抗体で、他方の抗体が本発明のタンパク質のC端部に反応する抗体であることが望ましい。

【0046】

また、本発明のタンパク質に対するモノクローナル抗体（以下、本発明のモノクローナル抗体と称する場合がある）を用いて本発明のタンパク質の定量を行なえるほか、組織染色等による検出を行なうこともできる。これらの目的には、抗体分子そのものを用いてもよく、また、抗体分子の $F(ab')_2$ 、 Fab' あるいは Fab 画分を用いてもよい。

本発明の抗体を用いる本発明のタンパク質の定量法は、特に制限されるべきものではなく、被測定液中の抗原量（例えば、タンパク質量）に対応した抗体、抗原もしくは抗体-抗原複合体の量を化学的または物理的手段により検出し、これを既知量の抗原を含む標準液を用いて作製した標準曲線より算出する測定法であれば、いずれの測定法を用いてもよい。例えば、ネフロメトリー、競合法、イムノメトリック法およびサンドイッチ法が好適に用いられるが、感度、特異性の点で、後述するサンドイッチ法を用いるのが特に好ましい。

標識物質を用いる測定法に用いられる標識剤としては、例えば、放射性同位元素、酵素、蛍光物質、発光物質などが用いられる。放射性同位元素としては、例えば、 $[^{125}I]$ 、 $[^{131}I]$ 、 $[^3H]$ 、 $[^{14}C]$ などが用いられる。上記酵素としては、安定で比活性の大きなものが好ましく、例えば、 β -ガラクトシダーゼ、 β -グルコシダーゼ、アルカリフォスファターゼ、パーオキシダーゼ、リンゴ酸脱水素酵素などが用いられる。蛍光物質としては、例えば、フルオレスカミン、フルオレッセンイソチオシアネートなどが用いられる。発光物質としては、例えば、ルミノール、ルミノール誘導体、ルシフェリン、ルシゲニンなどが用いられる。さらに、抗体あるいは抗原と標識剤との結合にビオチン-アビジン系を用いることもできる。

【0047】

抗原あるいは抗体の不溶化に当っては、物理吸着を用いてもよく、また通常タンパク質あるいは酵素等を不溶化、固定化するのに用いられる化学結合を用いる方法でもよい。担体としては、アガロース、デキストラン、セルロースなどの不

溶性多糖類、ポリスチレン、ポリアクリルアミド、シリコン等の合成樹脂、あるいはガラス等が挙げられる。

サンドイッチ法においては不溶化した本発明のモノクローナル抗体に被検液を反応させ（１次反応）、さらに標識化した別の本発明のモノクローナル抗体を反応させ（２次反応）たのち、不溶化担体上の標識剤の活性を測定することにより被検液中の本発明のタンパク質量を定量することができる。１次反応と２次反応は逆の順序に行っても、また、同時に行なってもよいし時間をずらして行なってもよい。標識化剤および不溶化の方法は前記のそれらに準じることができる。また、サンドイッチ法による免疫測定法において、固相用抗体あるいは標識用抗体に用いられる抗体は必ずしも１種類である必要はなく、測定感度を向上させる等の目的で２種類以上の抗体の混合物を用いてもよい。

本発明のサンドイッチ法による本発明のタンパク質の測定法においては、１次反応と２次反応に用いられる本発明のモノクローナル抗体は、本発明のタンパク質の結合する部位が相異なる抗体が好ましく用いられる。すなわち、１次反応および２次反応に用いられる抗体は、例えば、２次反応で用いられる抗体が、本発明のタンパク質のＣ端部を認識する場合、１次反応で用いられる抗体は、好ましくはＣ端部以外、例えばＮ端部を認識する抗体が用いられる。

【0048】

本発明のモノクローナル抗体をサンドイッチ法以外の測定システム、例えば、競合法、イムノメトリック法あるいはネフロメトリーなどに用いることができる。

競合法では、被検液中の抗原と標識抗原とを抗体に対して競合的に反応させたのち、未反応の標識抗原（F）と、抗体と結合した標識抗原（B）とを分離し（B／F分離）、B、Fいずれかの標識量を測定し、被検液中の抗原量を定量する。本反応法には、抗体として可溶性抗体を用い、B／F分離をポリエチレングリコール、前記抗体に対する第２抗体などを用いる液相法、および、第１抗体として固相化抗体を用いるか、あるいは、第１抗体は可溶性のものを用地第２抗体として固相化抗体を用いる固相化法とが用いられる。

イムノメトリック法では、被検液中の抗原と固相化抗原とを一定量の標識化抗

体に対して競合反応させた後固相と液相を分離するか、あるいは、被検液中の抗原と過剰量の標識化抗体とを反応させ、次に固相化抗原を加え未反応の標識化抗体を固相に結合させたのち、固相と液相を分離する。次に、いずれかの相の標識量を測定し被検液中の抗原量を定量する。

また、ネフロメトリーでは、ゲル内あるいは溶液中で抗原抗体反応の結果生じた不溶性の沈降物の量を測定する。被検液中の抗原量が僅かであり、少量の沈降物しか得られない場合にもレーザーの散乱を利用するレーザーネフロメトリーなどが好適に用いられる。

【0049】

これら個々の免疫学的測定法を本発明の定量方法に適用するにあたっては、特別の条件、操作等の設定は必要とされない。それぞれの方法における通常の方法、操作法に当業者の通常の技術的配慮を加えて本発明のタンパク質の測定系を構築すればよい。これらの一般的な技術手段の詳細については、総説、成書などを参照することができる。

例えば、入江 寛編「ラジオイムノアッセイ」(講談社、昭和49年発行)、入江 寛編「続ラジオイムノアッセイ」(講談社、昭和54年発行)、石川栄治ら編「酵素免疫測定法」(医学書院、昭和53年発行)、石川栄治ら編「酵素免疫測定法」(第2版)(医学書院、昭和57年発行)、石川栄治ら編「酵素免疫測定法」(第3版)(医学書院、昭和62年発行)、「Methods in ENZYMOLOGY」Vol. 70(Immunochemical Techniques(Part A))、同書 Vol. 73(Immunochemical Techniques(Part B))、同書 Vol. 74(Immunochemical Techniques(Part C))、同書 Vol. 84(Immunochemical Techniques(Part D:Selected Immunoassays))、同書 Vol. 92(Immunochemical Techniques(Part E:Monoclonal Antibodies and General Immunoassay Methods))、同書 Vol. 121(Immunochemical Techniques(Part I:Hybridoma Technology and Monoclonal Antibodies))(以上、アカデミックプレス社発行)などを参照することができる。

以上のようにして、本発明の抗体を用いることによって、本発明のタンパク質を感度良く定量することができる。

さらには、本発明の抗体を用いて本発明のタンパク質の濃度を定量することに

よって、本発明のタンパク質の濃度の増加または減少が検出された場合、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞蹈病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などである、または将来罹患する可能性が高いと診断することができる。

また、本発明の抗体は、体液や組織などの被検体中に存在する本発明のタンパク質を検出するために使用することができる。また、本発明のタンパク質を精製するために使用する抗体カラムの作製、精製時の各分画中の本発明のタンパク質の検出、被検細胞内における本発明のタンパク質の挙動の分析などのために使用することができる。

【0050】

（3）遺伝子診断薬

本発明のDNAは、例えば、プローブとして使用することにより、ヒトまたは温血動物（例えば、ラット、マウス、モルモット、ウサギ、トリ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ウマ、ネコ、イヌ、サル、チンパンジーなど）における本発明のタンパク質またはその部分ペプチドをコードするDNAまたはmRNAの異常（遺伝子異常）を検出することができるので、例えば、該DNAまたはmRNAの損傷、突然変異あるいは発現低下や、該DNAまたはmRNAの増加あるいは発現過多などの遺伝子診断薬として有用である。

本発明のDNAを用いる上記の遺伝子診断は、例えば、自体公知のノーザンハイブリダイゼーションやPCR-SSCP法（ゲノミックス（Genomics），第5巻，874～879頁（1989年）、プロシーディングズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシイズ・オブ・ユーエスエー（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America），第86巻，2766～2770頁（1989年））などにより実施することができる。

例えば、ノーザンハイブリダイゼーションにより発現過多または減少が検出された場合やPCR-SSCP法によりDNAの突然変異が検出された場合は、例

えば神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などである可能性が高いと診断することができる。

【0051】

（4）アンチセンスポリヌクレオチドを含有する医薬

本発明のDNAに相補的に結合し、該DNAの発現を抑制することができる本発明のアンチセンスポリヌクレオチドは低毒性であり、生体内における本発明のタンパク質または本発明のDNAの機能を抑制することができるので、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤として使用することができる。

上記アンチセンスポリヌクレオチドを上記の予防・治療剤として使用する場合、自体公知の方法に従って製剤化し、投与することができる。

また、例えば、前記のアンチセンスポリヌクレオチドを単独あるいはレトロウイルスベクター、アデノウイルスベクター、アデノウイルスアソシエーテッドウイルスベクターなどの適当なベクターに挿入した後、常套手段に従って、ヒトまたは哺乳動物（例、ラット、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ネコ、イヌ、サルなど）に対して経口的または非経口的に投与することができる。該アンチセンスポリヌクレオチドは、そのままで、あるいは摂取促進のために補助剤などの生理学的に認められる担体とともに製剤化し、遺伝子銃やハイドロゲルカテーテルのようなカテーテルによって投与できる。あるいは、エアロゾル化して吸入剤として気管内に局所投与することもできる。

さらに、体内動態の改良、半減期の長期化、細胞内取り込み効率の改善を目的に、前記のアンチセンスポリヌクレオチドを単独またはリポゾームなどの担体とともに製剤（注射剤）化し、静脈、皮下、病変部等に投与してもよい。

該アンチセンスポリヌクレオチドの投与量は、対象疾患、投与対象、投与ルートなどにより差異はあるが、例えば、アルツハイマー病の治療の目的で本発明のアンチセンスポリヌクレオチドを投与する場合、一般的に成人（体重 60 kg）においては、一日につき該アンチセンスポリヌクレオチドを約 0.1～100 mg 投与する。

さらに、該アンチセンスポリヌクレオチドは、組織や細胞における本発明の DNA の存在やその発現状況を調べるための診断用オリゴヌクレオチドプローブとして使用することもできる。

上記アンチセンスポリヌクレオチドと同様に、本発明のタンパク質をコードする RNA の一部を含有する二重鎖 RNA、本発明のタンパク質をコードする RNA の一部を含有するリボザイムなども、本発明の遺伝子の発現を抑制することができ、生体内における本発明で用いられるタンパク質または本発明で用いられる DNA の機能を抑制することができるので、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパシー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤などとして使用することができる。

二重鎖 RNA は、公知の方法（例、Nature, 411 巻, 494 頁, 2001 年）に準じて、本発明のポリヌクレオチドの配列を基に設計して製造することができる。

リボザイムは、公知の方法（例、TRENDS in Molecular Medicine, 7 巻, 221 頁, 2001 年）に準じて、本発明のポリヌクレオチドの配列を基に設計して製造することができる。例えば、本発明のタンパク質をコードする RNA の一部に公知のリボザイムを連結することによって製造することができる。本発明のタンパク質をコードする RNA の一部としては、公知のリボザイムによって切断され得る本発明の RNA 上の切断部位に近接した部分（RNA 断片）が挙げられる。

上記の二重鎖 RNA またはリボザイムを上記予防・治療剤として使用する場合、アンチセンスポリヌクレオチドと同様にして製剤化し、投与することができる。

【0052】

(5) 本発明の抗体を含有する医薬

本発明のタンパク質の活性を中和する作用を有する本発明の抗体は、例えば神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞蹈病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤として使用することができる。

本発明の抗体は、それ自体または適当な医薬組成物として投与することができる。上記投与に用いられる医薬組成物は、上記抗体またはその塩と薬理学的に許容され得る担体、希釈剤もしくは賦形剤とを含むものである。かかる組成物は、経口または非経口投与に適する剤形として提供される。

すなわち、例えば、経口投与のための組成物としては、固体または液体の剤形、具体的には錠剤（糖衣錠、フィルムコーティング錠を含む）、丸剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤（ソフトカプセル剤を含む）、シロップ剤、乳剤、懸濁剤などがあげられる。かかる組成物は公知の方法によって製造され、製剤分野において通常用いられる担体、希釈剤もしくは賦形剤を含有するものである。例えば、錠剤用の担体、賦形剤としては、乳糖、でんぷん、蔗糖、ステアリン酸マグネシウムなどが用いられる。

非経口投与のための組成物としては、例えば、注射剤、坐剤などが用いられ、注射剤は静脈注射剤、皮下注射剤、皮内注射剤、筋肉注射剤、点滴注射剤などの剤形を包含する。かかる注射剤は、公知の方法に従って、例えば、上記抗体またはその塩を通常注射剤に用いられる無菌の水性もしくは油性液に溶解、懸濁または乳化することによって調製する。注射用の水性液としては、例えば、生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助薬を含む等張液などが用いられ、適当な溶解補助剤、例えば、アルコール（例、エタノール）、ポリアルコール（例、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール）、非イオン界面活性剤〔例、ポリソルベート 80、HCO-50 (polyoxyethylene (50 mol) adduct of hydrogenated castor oil)〕などと併用してもよい。油性液としては、例えば、ゴマ油、大豆油などが用いられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジル、ベンジルアルコールな

どを併用してもよい。調製された注射液は、通常、適当なアンプルに充填される。直腸投与に用いられる坐剤は、上記抗体またはその塩を通常の坐薬用基剤に混合することによって調製される。

上記の経口用または非経口用医薬組成物は、活性成分の投与量に適合するような投薬単位の剤形に調製されることが好都合である。かかる投薬単位の剤形としては、錠剤、丸剤、カプセル剤、注射剤（アンプル）、坐剤などが例示され、それぞれの投薬単位剤形当たり通常 5～500 mg、とりわけ注射剤では 5～100 mg、その他の剤形では 10～250 mg の上記抗体が含有されていることが好ましい。

なお前記した各組成物は、上記抗体との配合により好ましくない相互作用を生じない限り他の活性成分を含有してもよい。

本発明の抗体を含有する上記疾患の予防・治療剤は低毒性であり、そのまま液剤として、または適当な剤型の医薬組成物として、ヒトまたは哺乳動物（例、ラット、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ネコ、イヌ、サルなど）に対して経口的または非経口的（例、静脈投与）に投与することができる。投与量は、投与対象、対象疾患、症状、投与ルートなどによっても異なるが、例えば、成人のアルツハイマー病の治療のために使用する場合には、本発明の抗体を 1 回量として、通常 0.01～20 mg/kg 体重程度、好ましくは 0.1～10 mg/kg 体重程度、さらに好ましくは 0.1～5 mg/kg 体重程度を、1 日 1～5 回程度、好ましくは 1 日 1～3 回程度、注射剤として投与するのが好都合である。他の非経口投与および経口投与の場合もこれに準ずる量を投与することができる。症状が特に重い場合には、その症状に応じて増量してもよい。

また、本発明の抗体は、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの診断薬としても有用である。

【0053】

（6）DNA 転移動物

本発明は、外来性の本発明のタンパク質をコードするDNA（以下、本発明の外来性DNAと略記する）またはその変異DNA（本発明の外来性変異DNAと略記する場合がある）を有する非ヒト哺乳動物を提供する。

すなわち、本発明は、

- (1) 本発明の外来性DNAまたはその変異DNAを有する非ヒト哺乳動物、
- (2) 非ヒト哺乳動物がゲッ歯動物である第(1)記載の動物、
- (3) ゲッ歯動物がマウスまたはラットである第(2)記載の動物、および
- (4) 本発明の外来性DNAまたはその変異DNAを含有し、哺乳動物において発現しうる組換えベクターを提供するものである。

【0054】

本発明の外来性DNAまたはその変異DNAを有する非ヒト哺乳動物（以下、本発明のDNA転移動物と略記する）は、未受精卵、受精卵、精子およびその始原細胞を含む胚芽細胞などに対して、好ましくは、非ヒト哺乳動物の発生における胚発生の段階（さらに好ましくは、単細胞または受精卵細胞の段階でかつ一般に8細胞期以前）に、リン酸カルシウム法、電気パルス法、リポフェクション法、凝集法、マイクロインジェクション法、パーティクルガン法、DEAE-デキストラン法などにより目的とするDNAを転移することによって作出することができる。また、該DNA転移方法により、体細胞、生体の臓器、組織細胞などに目的とする本発明の外来性DNAを転移し、細胞培養、組織培養などに利用することもでき、さらに、これら細胞を上述の胚芽細胞と自体公知の細胞融合法により融合させることにより本発明のDNA転移動物を作成することもできる。

非ヒト哺乳動物としては、例えば、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウサギ、イヌ、ネコ、モルモット、ハムスター、マウス、ラットなどが用いられる。なかでも、病体動物モデル系の作成の面から個体発生および生物サイクルが比較的短く、また、繁殖が容易なゲッ歯動物、とりわけマウス（例えば、純系として、C57BL/6系統、DBA2系統など、交雑系として、B6C3F1系統、BDF1系統、B6D2F1系統、BALB/c系統、ICR系統など）またはラット（例えば、Wistar, SDなど）などが好ましい。

哺乳動物において発現しうる組換えベクターにおける「哺乳動物」としては、

上記の非ヒト哺乳動物の他にヒトなどがあげられる。

【0055】

本発明の外來性DNAとは、非ヒト哺乳動物が本来有している本発明のDNAではなく、いったん哺乳動物から単離・抽出された本発明のDNAをいう。

本発明の変異DNAとしては、元の本発明のDNAの塩基配列に変異（例えば、突然変異など）が生じたもの、具体的には、塩基の付加、欠損、他の塩基への置換などが生じたDNAなどが用いられ、また、異常DNAも含まれる。

該異常DNAとしては、異常な本発明のタンパク質を発現させるDNAを意味し、例えば、正常な本発明のタンパク質の機能を抑制するタンパク質を発現させるDNAなどが用いられる。

本発明の外來性DNAは、対象とする動物と同種あるいは異種のどちらの哺乳動物由来のものであってもよい。本発明のDNAを対象動物に転移させるにあたっては、該DNAを動物細胞で発現させうるプロモーターの下流に結合したDNAコンストラクトとして用いるのが一般に有利である。例えば、本発明のヒトDNAを転移させる場合、これと相同性が高い本発明のDNAを有する各種哺乳動物（例えば、ウサギ、イヌ、ネコ、モルモット、ハムスター、ラット、マウスなど）由来のDNAを発現させうる各種プロモーターの下流に、本発明のヒトDNAを結合したDNAコンストラクト（例、ベクターなど）を対象哺乳動物の受精卵、例えば、マウス受精卵へマイクロインジェクションすることによって本発明のDNAを高発現するDNA転移哺乳動物を作出することができる。

【0056】

本発明のタンパク質の発現ベクターとしては、大腸菌由来のプラスミド、枯草菌由来のプラスミド、酵母由来のプラスミド、 λ ファージなどのバクテリオファージ、モロニー白血病ウイルスなどのレトロウイルス、ワクシニアウイルスまたはバキュロウイルスなどの動物ウイルスなどが用いられる。なかでも、大腸菌由来のプラスミド、枯草菌由来のプラスミドまたは酵母由来のプラスミドなどが好ましく用いられる。

上記のDNA発現調節を行なうプロモーターとしては、例えば、①ウイルス（例、シミアンウイルス、サイトメガロウイルス、モロニー白血病ウイルス、JC

ウイルス、乳がんウイルス、ポリオウイルスなど) に由来するDNAのプロモーター、②各種哺乳動物(ヒト、ウサギ、イヌ、ネコ、モルモット、ハムスター、ラット、マウスなど) 由来のプロモーター、例えば、アルブミン、インスリン I I、ウロプラキン I I、エラスターゼ、エリスロポエチン、エンドセリン、筋クレアチンキナーゼ、グリア線維性酸性タンパク質、グルタチオン S-トランスフェラーゼ、血小板由来成長因子 β 、ケラチン K 1, K 1 0 および K 1 4、コラーゲン I 型および I I 型、サイクリック AMP 依存タンパク質キナーゼ β I サブユニット、ジストロフィン、酒石酸抵抗性アルカリフォスファターゼ、心房ナトリウム利尿性因子、内皮レセプターチロシンキナーゼ(一般に T i e 2 と略される)、ナトリウムカリウムアデノシン 3 リン酸化酵素 (N a, K-ATP a s e)、ニューロフィラメント軽鎖、メタロチオネイン I および I I A、メタロプロテイナーゼ 1 組織インヒビター、MHC クラス I 抗原 (H-2 L)、H-r a s、レニン、ドーパミン β -水酸化酵素、甲状腺ペルオキシダーゼ (T P O)、ペプチド鎖延長因子 1 α (E F-1 α)、 β アクチン、 α および β ミオシン重鎖、ミオシン軽鎖 1 および 2、ミエリン基礎タンパク質、チログロブリン、T h y-1、免疫グロブリン、H 鎖可変部 (V N P)、血清アミロイド P コンポーネント、ミオグロビン、トロポニン C、平滑筋 α アクチン、プレプロエンケファリン A、バソプレシンなどのプロモーターなどが用いられる。なかでも、全身で高発現することが可能なサイトメガロウイルスプロモーター、ヒトペプチド鎖延長因子 1 α (E F-1 α) のプロモーター、ヒトおよびニワトリ β アクチンプロモーターなどが好適である。

上記ベクターは、DNA 転移哺乳動物において目的とするメッセンジャー RNA の転写を終結する配列(一般にターミネターと呼ばれる)を有していることが好ましく、例えば、ウイルス由来および各種哺乳動物由来の各 DNA の配列を用いることができ、好ましくは、シミアンウイルスの S V 4 0 ターミネターなどが用いられる。

【0057】

その他、目的とする外来性 DNA をさらに高発現させる目的で各 DNA のスプライシングシグナル、エンハンサー領域、真核 DNA のイントロンの一部などを

プロモーター領域の 5' 上流、プロモーター領域と翻訳領域間あるいは翻訳領域の 3' 下流 に連結することも目的により可能である。

正常な本発明のタンパク質の翻訳領域は、ヒトまたは各種哺乳動物（例えば、ウサギ、イヌ、ネコ、モルモット、ハムスター、ラット、マウスなど）由来の肝臓、腎臓、甲状腺細胞、線維芽細胞由来 DNA および市販の各種ゲノム DNA ライブラリーよりゲノム DNA の全てあるいは一部として、または肝臓、腎臓、甲状腺細胞、線維芽細胞由来 RNA より公知の方法により調製された相補 DNA を原料として取得することが出来る。また、外来性の異常 DNA は、上記の細胞または組織より得られた正常なタンパク質の翻訳領域を点突然変異誘発法により変異した翻訳領域を作製することができる。

該翻訳領域は転移動物において発現しうる DNA コンストラクトとして、前記のプロモーターの下流および所望により転写終結部位の上流に連結させる通常の DNA 工学的手法により作製することができる。

受精卵細胞段階における本発明の外来性 DNA の転移は、対象哺乳動物の胚芽細胞および体細胞のすべてに存在するように確保される。DNA 転移後の作出動物の胚芽細胞において、本発明の外来性 DNA が存在することは、作出動物の後代がすべて、その胚芽細胞および体細胞のすべてに本発明の外来性 DNA を保持することを意味する。本発明の外来性 DNA を受け継いだこの種の動物の子孫はその胚芽細胞および体細胞のすべてに本発明の外来性 DNA を有する。

本発明の外来性正常 DNA を転移させた非ヒト哺乳動物は、交配により外来性 DNA を安定に保持することを確認して、該 DNA 保有動物として通常の飼育環境で継代飼育することが出来る。

受精卵細胞段階における本発明の外来性 DNA の転移は、対象哺乳動物の胚芽細胞および体細胞の全てに過剰に存在するように確保される。DNA 転移後の作出動物の胚芽細胞において本発明の外来性 DNA が過剰に存在することは、作出動物の子孫が全てその胚芽細胞および体細胞の全てに本発明の外来性 DNA を過剰に有することを意味する。本発明の外来性 DNA を受け継いだこの種の動物の子孫はその胚芽細胞および体細胞の全てに本発明の外来性 DNA を過剰に有する。

。

導入DNAを相同染色体の両方に持つホモザイゴート動物を取得し、この雌雄の動物を交配することによりすべての子孫が該DNAを過剰に有するように繁殖継代することができる。

【0058】

本発明の正常DNAを有する非ヒト哺乳動物は、本発明の正常DNAが高発現させられており、内在性の正常DNAの機能を促進することにより最終的に本発明のタンパク質の機能亢進症を発症することがあり、その病態モデル動物として利用することができる。例えば、本発明の正常DNA転移動物を用いて、本発明のタンパク質の機能亢進症や、本発明のタンパク質に関連する疾患の病態機序の解明およびこれらの疾患の治療方法の検討を行なうことが可能である。

また、本発明の外来性正常DNAを転移させた哺乳動物は、遊離した本発明のタンパク質の増加症状を有することから、本発明のタンパク質に関連する疾患に対する予防・治療剤、例えば神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤のスクリーニング試験にも利用可能である。

一方、本発明の外来性異常DNAを有する非ヒト哺乳動物は、交配により外来性DNAを安定に保持することを確認して該DNA保有動物として通常の飼育環境で継代飼育することが出来る。さらに、目的とする外来DNAを前述のプラスミドに組み込んで原料として用いることができる。プロモーターとのDNAコンストラクトは、通常のDNA工学的手法によって作製することができる。受精卵細胞段階における本発明の異常DNAの転移は、対象哺乳動物の胚芽細胞および体細胞の全てに存在するように確保される。DNA転移後の作出動物の胚芽細胞において本発明の異常DNAが存在することは、作出動物の子孫が全てその胚芽細胞および体細胞の全てに本発明の異常DNAを有することを意味する。本発明の外来性DNAを受け継いだこの種の動物の子孫は、その胚芽細胞および体細胞の全てに本発明の異常DNAを有する。導入DNAを相同染色体の両方に持つホモザイゴート動物を取得し、この雌雄の動物を交配することによりすべての子孫

が該DNAを有するように繁殖継代することができる。

【0059】

本発明の異常DNAを有する非ヒト哺乳動物は、本発明の異常DNAが高発現させられており、内在性の正常DNAの機能を阻害することにより最終的に本発明のタンパク質の機能不活性型不応症となることがあり、その病態モデル動物として利用することができる。例えば、本発明の異常DNA転移動物を用いて、本発明のタンパク質の機能不活性型不応症の病態機序の解明およびこの疾患を治療方法の検討を行なうことが可能である。

また、具体的な利用可能性としては、本発明の異常DNA高発現動物は、本発明のタンパク質の機能不活性型不応症における本発明の異常タンパク質による正常タンパク質の機能阻害（dominant negative作用）を解明するモデルとなる。

また、本発明の外来異常DNAを転移させた哺乳動物は、遊離した本発明のタンパク質の増加症状を有することから、本発明のタンパク質または機能不活性型不応症に対する予防・治療剤、例えば神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤のスクリーニング試験にも利用可能である。

また、上記2種類の本発明のDNA転移動物のその他の利用可能性として、例えば、

- ①組織培養のための細胞源としての使用、
- ②本発明のDNA転移動物の組織中のDNAもしくはRNAを直接分析するか、またはDNAにより発現されたペプチド組織を分析することによる、本発明のタンパク質により特異的に発現あるいは活性化するペプチドとの関連性についての解析、
- ③DNAを有する組織の細胞を標準組織培養技術により培養し、これらを使用して、一般に培養困難な組織からの細胞の機能の研究、
- ④上記③記載の細胞を用いることによる細胞の機能を高めるような薬剤のスクリーニング、および

⑤本発明の変異タンパク質を単離精製およびその抗体作製などが考えられる。

【0060】

さらに、本発明のDNA転移動物を用いて、本発明のタンパク質の機能不活性型不応症などを含む、本発明のタンパク質に関連する疾患の臨床症状を調べることができ、また、本発明のタンパク質に関連する疾患モデルの各臓器におけるより詳細な病理学的所見が得られ、新しい治療方法の開発、さらには、該疾患による二次的疾患の研究および治療に貢献することができる。

また、本発明のDNA転移動物から各臓器を取り出し、細切後、トリプシンなどのタンパク質分解酵素により、遊離したDNA転移細胞の取得、その培養またはその培養細胞の系統化を行なうことが可能である。さらに、本発明のタンパク質産生細胞の特定化、アポトーシス、分化あるいは増殖との関連性、またはそれらにおけるシグナル伝達機構を調べ、それらの異常を調べることなどができ、本発明のタンパク質およびその作用解明のための有効な研究材料となる。

さらに、本発明のDNA転移動物を用いて、本発明のタンパク質の機能不活性型不応症を含む、本発明のタンパク質に関連する疾患の治療薬の開発を行なうために、上述の検査法および定量法などを用いて、有効で迅速な該疾患治療薬のスクリーニング法を提供することが可能となる。また、本発明のDNA転移動物または本発明の外来性DNA発現ベクターを用いて、本発明のタンパク質が関連する疾患のDNA治療法を検討、開発することが可能である。

【0061】

(7) ノックアウト動物

本発明は、本発明のDNAが不活性化された非ヒト哺乳動物胚幹細胞および本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物を提供する。

すなわち、本発明は、

- (1) 本発明のDNAが不活性化された非ヒト哺乳動物胚幹細胞、
- (2) 該DNAがレポーター遺伝子（例、大腸菌由来の β -ガラクトシダーゼ遺伝子）を導入することにより不活性化された第(1)項記載の胚幹細胞、
- (3) ネオマイシン耐性である第(1)項記載の胚幹細胞、
- (4) 非ヒト哺乳動物がゲッ歯動物である第(1)項記載の胚幹細胞、

- (5) ゲット動物がマウスである第(4)項記載の胚幹細胞、
(6) 本発明のDNAが不活性化された該DNA発現不全非ヒト哺乳動物、
(7) 該DNAがレポーター遺伝子(例、大腸菌由来の β -ガラクトシダーゼ遺伝子)を導入することにより不活性化され、該レポーター遺伝子が本発明のDNAに対するプロモーターの制御下で発現しうる第(6)項記載の非ヒト哺乳動物、
(8) 非ヒト哺乳動物がゲット動物である第(6)項記載の非ヒト哺乳動物、
(9) ゲット動物がマウスである第(8)項記載の非ヒト哺乳動物、および
(10) 第(7)項記載の動物に、試験化合物を投与し、レポーター遺伝子の発現を検出することを特徴とする本発明のDNAに対するプロモーター活性を促進または阻害する化合物またはその塩のスクリーニング方法を提供する。

【0062】

本発明のDNAが不活性化された非ヒト哺乳動物胚幹細胞とは、該非ヒト哺乳動物が有する本発明のDNAに人為的に変異を加えることにより、DNAの発現能を抑制するか、もしくは該DNAがコードしている本発明のタンパク質の活性を実質的に喪失させることにより、DNAが実質的に本発明のタンパク質の発現能を有さない(以下、本発明のノックアウトDNAと称することがある)非ヒト哺乳動物の胚幹細胞(以下、ES細胞と略記する)をいう。

非ヒト哺乳動物としては、前記と同様のものが用いられる。

本発明のDNAに人為的に変異を加える方法としては、例えば、遺伝子工学的手法により該DNA配列の一部又は全部の削除、他DNAを挿入または置換させることによって行なうことができる。これらの変異により、例えば、コドンの読み取り枠をずらしたり、プロモーターあるいはエキソンの機能を破壊することにより本発明のノックアウトDNAを作製すればよい。

【0063】

本発明のDNAが不活性化された非ヒト哺乳動物胚幹細胞(以下、本発明のDNA不活性化ES細胞または本発明のノックアウトES細胞と略記する)の具体例としては、例えば、目的とする非ヒト哺乳動物が有する本発明のDNAを単離し、そのエキソン部分にネオマイシン耐性遺伝子、ハイグロマイシン耐性遺伝子

を代表とする薬剤耐性遺伝子、あるいは *lacZ* (β -ガラクトシダーゼ遺伝子)、*cat* (クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ遺伝子) を代表とするレポーター遺伝子等を挿入することによりエキソンの機能を破壊するか、あるいはエキソン間のイントロン部分に遺伝子の転写を終結させる DNA 配列 (例えば、*polyA* 付加シグナルなど) を挿入し、完全なメッセンジャー RNA を合成できなくすることによって、結果的に遺伝子を破壊するように構築した DNA 配列を有する DNA 鎖 (以下、ターゲッティングベクターと略記する) を、例えば相同組換え法により該動物の染色体に導入し、得られた ES 細胞について本発明の DNA 上あるいはその近傍の DNA 配列をプローブとしたサザンハイブリダイゼーション解析あるいはターゲッティングベクター上の DNA 配列とターゲッティングベクター作製に使用した本発明の DNA 以外の近傍領域の DNA 配列をプライマーとした PCR 法により解析し、本発明のノックアウト ES 細胞を選別することにより得ることができる。

また、相同組換え法等により本発明の DNA を不活化させる元の ES 細胞としては、例えば、前述のような既に樹立されたものを用いてもよく、また公知 Evans と Kaufman の方法に準じて新しく樹立したものでもよい。例えば、マウスの ES 細胞の場合、現在、一般的には 129 系の ES 細胞が使用されているが、免疫学的背景がはっきりしていないので、これに代わる純系で免疫学的に遺伝的背景が明らかな ES 細胞を取得するなどの目的で例えば、C57BL/6 マウスや C57BL/6 の採卵数の少なさを DBA/2 との交雑により改善した BDF₁ マウス (C57BL/6 と DBA/2 との F₁) を用いて樹立したものなども良好に用いる。BDF₁ マウスは、採卵数が多く、かつ、卵が丈夫であるという利点に加えて、C57BL/6 マウスを背景に持つので、これを用いて得られた ES 細胞は病態モデルマウスを作出したとき、C57BL/6 マウスとバッククロスすることでその遺伝的背景を C57BL/6 マウスに代えることが可能である点で有利に用い得る。

また、ES 細胞を樹立する場合、一般には受精後 3.5 日目の胚盤胞を使用するが、これ以外に 8 細胞期胚を採卵し胚盤胞まで培養して用いることにより効率よく多数の初期胚を取得することができる。

また、雌雄いずれのES細胞を用いてもよいが、通常雄のES細胞の方が生殖系列キメラを作出するのに都合が良い。また、煩雑な培養の手間を削減するためにもできるだけ早く雌雄の判別を行なうことが望ましい。

【0064】

ES細胞の雌雄の判定方法としては、例えば、PCR法によりY染色体上の性決定領域の遺伝子を増幅、検出する方法が、その1例としてあげることができる。この方法を使用すれば、従来、核型分析をするのに約 10^6 個の細胞数を要していたのに対して、1コロニー程度のES細胞数（約50個）で済むので、培養初期におけるES細胞の第一次セレクションを雌雄の判別で行なうことが可能であり、早期に雄細胞の選定を可能にしたことにより培養初期の手間は大幅に削減できる。

また、第二次セレクションとしては、例えば、Gーバンディング法による染色体数の確認等により行うことができる。得られるES細胞の染色体数は正常数の100%が望ましいが、樹立の際の物理的操作等の関係上困難な場合は、ES細胞の遺伝子をノックアウトした後、正常細胞（例えば、マウスでは染色体数が $2n=40$ である細胞）に再びクローニングすることが望ましい。

このようにして得られた胚幹細胞株は、通常その増殖性は大変良いが、個体発生できる能力を失いやすいので、注意深く継代培養することが必要である。例えば、STO繊維芽細胞のような適当なフィーダー細胞上でLIF（ $1-1000$ U/ml）存在下に炭酸ガス培養器内（好ましくは、5%炭酸ガス、95%空気または5%酸素、5%炭酸ガス、90%空気）で約 37°C で培養するなどの方法で培養し、継代時には、例えば、トリプシン／EDTA溶液（通常 $0.001-0.5\%$ トリプシン／ $0.1-5\text{ mM}$ EDTA、好ましくは約 0.1% トリプシン／ 1 mM EDTA）処理により単細胞化し、新たに用意したフィーダー細胞上に播種する方法などがとられる。このような継代は、通常1-3日毎に行なうが、この際に細胞の観察を行い、形態的に異常な細胞が見受けられた場合はその培養細胞は放棄することが望まれる。

ES細胞は、適当な条件により、高密度に至るまで単層培養するか、または細胞集塊を形成するまで浮遊培養することにより、頭頂筋、内臓筋、心筋などの種

々のタイプの細胞に分化させることが可能であり [M. J. Evans及びM. H. Kaufman, ネイチャー (Nature) 第292巻、154頁、1981年; G. R. Martin プロシーディングス・オブ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス・ユーエスエー (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.) 第78巻、7634頁、1981年; T. C. Doetschmanら、ジャーナル・オブ・エンブリオロジー・アンド・エクスペリメンタル・モルフォロジー、第87巻、27頁、1985年]、本発明のES細胞を分化させて得られる本発明のDNA発現不全細胞は、インビトロにおける本発明のタンパク質の細胞生物学的検討において有用である。

【0065】

本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物は、該動物のmRNA量を公知方法を用いて測定して間接的にその発現量を比較することにより、正常動物と区別することが可能である。

該非ヒト哺乳動物としては、前記と同様のものが用いられる。

本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物は、例えば、前述のようにして作製したターゲッティングベクターをマウス胚幹細胞またはマウス卵細胞に導入し、導入によりターゲッティングベクターの本発明のDNAが不活性化されたDNA配列が遺伝子相同組換えにより、マウス胚幹細胞またはマウス卵細胞の染色体上の本発明のDNAと入れ換わる相同組換えをさせることにより、本発明のDNAをノックアウトさせることができる。

本発明のDNAがノックアウトされた細胞は、本発明のDNA上またはその近傍のDNA配列をプローブとしたサザンハイブリダイゼーション解析またはターゲッティングベクター上のDNA配列と、ターゲッティングベクターに使用したマウス由来の本発明のDNA以外の近傍領域のDNA配列とをプライマーとしたPCR法による解析で判定することができる。非ヒト哺乳動物胚幹細胞を用いた場合は、遺伝子相同組換えにより、本発明のDNAが不活性化された細胞株をクローニングし、その細胞を適当な時期、例えば、8細胞期の非ヒト哺乳動物胚または胚盤胞に注入し、作製したキメラ胚を偽妊娠させた該非ヒト哺乳動物の子宮に移植する。作出された動物は正常な本発明のDNA座をもつ細胞と人為的に変異した本発明のDNA座をもつ細胞との両者から構成されるキメラ動物である。

該キメラ動物の生殖細胞の一部が変異した本発明のDNA座をもつ場合、このようなキメラ個体と正常個体を交配することにより得られた個体群より、全ての組織が人為的に変異を加えた本発明のDNA座をもつ細胞で構成された個体を、例えば、コートカラーの判定等により選別することにより得られる。このようにして得られた個体は、通常、本発明のタンパク質のヘテロ発現不全個体であり、本発明のタンパク質のヘテロ発現不全個体同志を交配し、それらの産仔から本発明のタンパク質のホモ発現不全個体を得ることができる。

【0066】

卵細胞を使用する場合は、例えば、卵細胞核内にマイクロインジェクション法でDNA溶液を注入することによりターゲティングベクターを染色体内に導入したトランスジェニック非ヒト哺乳動物を得ることができ、これらのトランスジェニック非ヒト哺乳動物に比べて、遺伝子相同組換えにより本発明のDNA座に変異のあるものを選択することにより得られる。

このようにして本発明のDNAがノックアウトされている個体は、交配により得られた動物個体も該DNAがノックアウトされていることを確認して通常の飼育環境で飼育継代を行なうことができる。

さらに、生殖系列の取得および保持についても常法に従えばよい。すなわち、該不活化DNAの保有する雌雄の動物を交配することにより、該不活化DNAを相同染色体の両方に持つホモザイゴート動物を取得しうる。得られたホモザイゴート動物は、母親動物に対して、正常個体1，ホモザイゴート複数になるような状態で飼育することにより効率的に得ることができる。ヘテロザイゴート動物の雌雄を交配することにより、該不活化DNAを有するホモザイゴートおよびヘテロザイゴート動物を繁殖継代する。

本発明のDNAが不活性化された非ヒト哺乳動物胚幹細胞は、本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物を作出する上で、非常に有用である。

また、本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物は、本発明のタンパク質により誘導され得る種々の生物活性を欠失するため、本発明のタンパク質の生物活性の不活性化を原因とする疾病のモデルとなり得るので、これらの疾病の原因究明及び治療法の検討に有用である。

【0067】

(7a) 本発明のDNAの欠損や損傷などに起因する疾病に対して治療・予防効果を有する化合物のスクリーニング方法

本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物は、本発明のDNAの欠損や損傷などに起因する疾病に対して治療・予防効果を有する化合物のスクリーニングに用いることができる。

すなわち、本発明は、本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物に試験化合物を投与し、該動物の変化を観察・測定することを特徴とする、本発明のDNAの欠損や損傷などに起因する疾病、例えば神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など）、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などに対して治療・予防効果を有する化合物またはその塩のスクリーニング方法を提供する。

該スクリーニング方法において用いられる本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物としては、前記と同様のものがあげられる。

試験化合物としては、例えば、ペプチド、タンパク、非ペプチド性化合物、合成化合物、発酵生産物、細胞抽出液、植物抽出液、動物組織抽出液、血漿などがあげられ、これら化合物は新規な化合物であってもよいし、公知の化合物であってもよい。

具体的には、本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物を、試験化合物で処理し、無処理の対照動物と比較し、該動物の各器官、組織、疾病の症状などの変化を指標として試験化合物の治療・予防効果を試験することができる。

試験動物を試験化合物で処理する方法としては、例えば、経口投与、静脈注射などが用いられ、試験動物の症状、試験化合物の性質などにあわせて適宜選択することができる。また、試験化合物の投与量は、投与方法、試験化合物の性質などにあわせて適宜選択することができる。

【0068】

例えば神経変性疾患〔例、アルツハイマー病（家族性アルツハイマー病、若年

性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など)、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など] などに対して治療・予防効果を有する化合物をスクリーニングする場合、本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物に試験化合物を投与し、試験化合物非投与群と神経細胞死数の違い、種々のタンパク質量の違いなどを上記組織で経時的に観察する。

該スクリーニング方法において、試験動物に試験化合物を投与した場合、該試験動物の上記疾患症状が約10%以上、好ましくは約30%以上、より好ましくは約50%以上改善した場合、該試験化合物を上記の疾患に対して治療・予防効果を有する化合物として選択することができる。

該スクリーニング方法を用いて得られる化合物は、上記した試験化合物から選ばれた化合物であり、本発明のタンパク質の欠損や損傷などによって引き起こされる疾患に対して治療・予防効果を有するので、該疾患に対する安全で低毒性な予防・治療剤などの医薬として使用することができる。さらに、上記スクリーニングで得られた化合物から誘導される化合物も同様に用いることができる。

該スクリーニング方法で得られた化合物は塩を形成していてもよく、該化合物の塩としては、生理学的に許容される酸(例、無機酸、有機酸など)や塩基(例、アルカリ金属など)などとの塩が用いられ、とりわけ生理学的に許容される酸付加塩が好ましい。この様な塩としては、例えば、無機酸(例えば、塩酸、リン酸、臭化水素酸、硫酸など)との塩、あるいは有機酸(例えば、酢酸、ギ酸、プロピオン酸、フマル酸、マレイン酸、コハク酸、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸、蔞酸、安息香酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸など)との塩などが用いられる。

該スクリーニング方法で得られた化合物またはその塩を含有する医薬は、前記した本発明のタンパク質を含有する医薬と同様にして製造することができる。

このようにして得られる製剤は、安全で低毒性であるので、例えば、ヒトまたは哺乳動物(例えば、ラット、マウス、モルモット、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ウマ、ネコ、イヌ、サルなど)に対して投与することができる。

該化合物またはその塩の投与量は、対象疾患、投与対象、投与ルートなどによ

り差異はあるが、例えば、該化合物を経口投与する場合、一般的に成人（体重 60 kg として）のアルツハイマー病患者においては、一日につき該化合物を約 0.1～100 mg、好ましくは約 1.0～50 mg、より好ましくは約 1.0～20 mg 投与する。非経口的に投与する場合は、該化合物の 1 回投与量は投与対象、対象疾患などによっても異なるが、例えば、該化合物を注射剤の形で通常成人（60 kg として）のアルツハイマー病患者に投与する場合、一日につき該化合物を約 0.01～30 mg 程度、好ましくは約 0.1～20 mg 程度、より好ましくは約 0.1～10 mg 程度を静脈注射により投与するのが好都合である。他の動物の場合も、60 kg 当たりに換算した量を投与することができる。

【0069】

（7b）本発明の DNA に対するプロモーターの活性を促進または阻害する化合物をスクリーニング方法

本発明は、本発明の DNA 発現不全非ヒト哺乳動物に、試験化合物を投与し、レポーター遺伝子の発現を検出することを特徴とする本発明の DNA に対するプロモーターの活性を促進または阻害する化合物またはその塩のスクリーニング方法を提供する。

上記スクリーニング方法において、本発明の DNA 発現不全非ヒト哺乳動物としては、前記した本発明の DNA 発現不全非ヒト哺乳動物の中でも、本発明の DNA がレポーター遺伝子を導入することにより不活性化され、該レポーター遺伝子が本発明の DNA に対するプロモーターの制御下で発現しうるものが用いられる。

試験化合物としては、前記と同様のものがあげられる。

レポーター遺伝子としては、前記と同様のものが用いられ、 β -ガラクトシダーゼ遺伝子（lacZ）、可溶性アルカリフォスファターゼ遺伝子またはルシフェラーゼ遺伝子などが好適である。

本発明の DNA をレポーター遺伝子で置換された本発明の DNA 発現不全非ヒト哺乳動物では、レポーター遺伝子が本発明の DNA に対するプロモーターの支配下に存在するので、レポーター遺伝子がコードする物質の発現をトレースすることにより、プロモーターの活性を検出することができる。

例えば、本発明のタンパク質をコードする DNA 領域の一部を大腸菌由来の β -ガラクトシダーゼ遺伝子 (lacZ) で置換している場合、本来、本発明のタンパク質の発現する組織で、本発明のタンパク質の代わりに β -ガラクトシダーゼが発現する。従って、例えば、5-プロモ-4-クロロ-3-インドリル- β -ガラクトピラノシド (X-gal) のような β -ガラクトシダーゼの基質となる試薬を用いて染色することにより、簡便に本発明のタンパク質の動物生体内における発現状態を観察することができる。具体的には、本発明のタンパク質欠損マウスまたはその組織切片をグルタルアルデヒドなどで固定し、リン酸緩衝生理食塩液 (PBS) で洗浄後、X-gal を含む染色液で、室温または 37℃ 付近で、約 30 分ないし 1 時間反応させた後、組織標本を 1 mM EDTA/PBS 溶液で洗浄することによって、 β -ガラクトシダーゼ反応を停止させ、呈色を観察すればよい。また、常法に従い、lacZ をコードする mRNA を検出してもよい。

上記スクリーニング方法を用いて得られる化合物またはその塩は、上記した試験化合物から選ばれた化合物であり、本発明の DNA に対するプロモーター活性を促進または阻害する化合物である。

該スクリーニング方法で得られた化合物は塩を形成していてもよく、該化合物の塩としては、生理学的に許容される酸 (例、無機酸など) や塩基 (例、アルカリ金属など) などとの塩が用いられ、とりわけ生理学的に許容される酸付加塩が好ましい。この様な塩としては、例えば、無機酸 (例えば、塩酸、リン酸、臭化水素酸、硫酸など) との塩、あるいは有機酸 (例えば、酢酸、ギ酸、プロピオン酸、フマル酸、マレイン酸、コハク酸、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸、蔞酸、安息香酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸など) との塩などが用いられる。

【0070】

本発明の DNA に対するプロモーター活性を促進または阻害する化合物またはその塩は、本発明のタンパク質の発現の調節、該タンパク質の機能を調節することができるので、例えば神経変性疾患 [例、アルツハイマー病 (家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など)、パーキン

ソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞蹈病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など] などの予防・治療剤として有用である。

さらに、上記スクリーニングで得られた化合物から誘導される化合物も同様に用いることができる。

該スクリーニング方法で得られた化合物またはその塩を含有する医薬は、前記した本発明のタンパク質またはその塩を含有する医薬と同様にして製造することができる。

このようにして得られる製剤は、安全で低毒性であるので、例えば、ヒトまたは哺乳動物（例えば、ラット、マウス、モルモット、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ウマ、ネコ、イヌ、サルなど）に対して投与することができる。

該化合物またはその塩の投与量は、対象疾患、投与対象、投与ルートなどにより差異はあるが、例えば、本発明のDNAに対するプロモーター活性を阻害する化合物を経口投与する場合、一般的に成人（体重60kgとして）のアルツハイマー病患者においては、一日につき該化合物を約0.1～100mg、好ましくは約1.0～50mg、より好ましくは約1.0～20mg投与する。非経口的に投与する場合は、該化合物の1回投与量は投与対象、対象疾患などによっても異なるが、例えば、本発明のDNAに対するプロモーター活性を阻害する化合物を注射剤の形で通常成人（60kgとして）のアルツハイマー病患者に投与する場合、一日につき該化合物を約0.01～30mg程度、好ましくは約0.1～20mg程度、より好ましくは約0.1～10mg程度を静脈注射により投与するのが好都合である。他の動物の場合も、60kg当りに換算した量を投与することができる。

このように、本発明のDNA発現不全非ヒト哺乳動物は、本発明のDNAに対するプロモーターの活性を促進または阻害する化合物またはその塩をスクリーニングする上で極めて有用であり、本発明のDNA発現不全に起因する各種疾患の原因究明または予防・治療剤の開発に大きく貢献することができる。

また、本発明のタンパク質のプロモーター領域を含有するDNAを使って、その下流に種々のタンパクをコードする遺伝子を連結し、これを動物の卵細胞に注

入していわゆるトランスジェニック動物（遺伝子移入動物）を作成すれば、特異的にそのタンパク質を合成させ、その生体での作用を検討することも可能となる。さらに上記プロモーター部分に適当なレポーター遺伝子を結合させ、これが発現するような細胞株を樹立すれば、本発明のタンパク質そのものの体内での産生能力を特異的に促進もしくは抑制する作用を持つ低分子化合物の探索系として使用できる。

【0071】

本明細書において、塩基やアミノ酸などを略号で表示する場合、IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature による略号あるいは当該分野における慣用略号に基づくものであり、その例を下記する。またアミノ酸に関し光学異性体があり得る場合は、特に明示しなければL体を示すものとする。

DNA	: デオキシリボ核酸
cDNA	: 相補的デオキシリボ核酸
A	: アデニン
T	: チミン
G	: グアニン
C	: シトシン
RNA	: リボ核酸
mRNA	: メッセンジャーリボ核酸
dATP	: デオキシアデノシン三リン酸
dTTP	: デオキシチミジン三リン酸
dGTP	: デオキシグアノシン三リン酸
dCTP	: デオキシシチジン三リン酸
ATP	: アデノシン三リン酸
EDTA	: エチレンジアミン四酢酸
SDS	: ドデシル硫酸ナトリウム
Gly	: グリシン
Ala	: アラニン
Val	: バリン

L e u	: ロイシン
I l e	: イソロイシン
S e r	: セリン
T h r	: スレオニン
C y s	: システイン
M e t	: メチオニン
G l u	: グルタミン酸
A s p	: アスパラギン酸
L y s	: リジン
A r g	: アルギニン
H i s	: ヒスチジン
P h e	: フェニルアラニン
T y r	: チロシン
T r p	: トリプトファン
P r o	: プロリン
A s n	: アスパラギン
G l n	: グルタミン
p G l u	: ピログルタミン酸
S e c	: セレノシステイン (selenocysteine)

【0072】

また、本明細書中で繁用される置換基、保護基および試薬を下記の記号で表記する。

M e	: メチル基
E t	: エチル基
B u	: ブチル基
P h	: フェニル基
T C	: チアゾリジン-4 (R) -カルボキサミド基
T o s	: p-トルエンスルフォニル
C H O	: ホルミル

Bz l	: ベンジル
Cl ₂ -Bzl	: 2, 6-ジクロロベンジル
Bom	: ベンジルオキシメチル
Z	: ベンジルオキシカルボニル
Cl-Z	: 2-クロロベンジルオキシカルボニル
Br-Z	: 2-ブロモベンジルオキシカルボニル
Boc	: t-ブトキシカルボニル
DNP	: ジニトロフェニル
Trt	: トリチル
Bum	: t-ブトキシメチル
Fmoc	: N-9-フルオレニルメトキシカルボニル
HOBt	: 1-ヒドロキシベンズトリアゾール
HOObt	: 3, 4-ジヒドロ-3-ヒドロキシー-4-オキソ- 1, 2, 3-ベンゾトリアジン
HONB	: 1-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド
DCC	: N, N'-ジシクロヘキシルカルボジイミド

【0073】

本願明細書の配列表の配列番号は、以下の配列を示す。

〔配列番号：1〕

ヒトNeuronal cell death inducible putative kinase (NIPK) のアミノ酸配列を示す。

〔配列番号：2〕

ヒトNIPKをコードするDNAの塩基配列を示す。

〔配列番号：3〕

実施例3で用いられたプライマーの塩基配列を示す。

〔配列番号：4〕

実施例3で用いられたプライマーの塩基配列を示す。

〔配列番号：5〕

GenBank Accession NO.NM021158の塩基配列を示す。

〔配列番号： 6〕

配列番号： 5 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

〔配列番号： 7〕

GenBank Accession NO. NM021158 の 251 番目の A が G に置換された塩基配列を示す。

〔配列番号： 8〕

配列番号： 7 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

〔配列番号： 9〕

GenBank Accession NO. AAF30480 の塩基配列を示す。

〔配列番号： 1 0〕

配列番号： 9 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

〔配列番号： 1 1〕

GenBank Accession NO. AAH76218 の塩基配列を示す。

〔配列番号： 1 2〕

配列番号： 1 1 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

〔配列番号： 1 3〕

GenBank Accession NO. AAI58064 の塩基配列を示す。

〔配列番号： 1 4〕

配列番号： 1 3 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

〔配列番号： 1 5〕

GenBank Accession NO. AAI59850 の塩基配列を示す。

〔配列番号： 1 6〕

配列番号： 1 5 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

〔配列番号： 1 7〕

GenBank Accession NO. AAS06709 の塩基配列を示す。

〔配列番号： 1 8〕

配列番号： 1 7 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

〔配列番号： 1 9〕

GenBank Accession NO. AF250311 の塩基配列を示す。

〔配列番号： 2 0〕

配列番号: 19 で示される塩基配列がコードするアミノ酸配列を示す。

【0074】

【発明の実施の形態】

以下において、実施例により本発明をより具体的に示すが、この発明はこれらに限定されるものではない。

【実施例】

実施例 1

小胞体ストレスで発現変動する遺伝子群を明らかにするため、以下のような実験を行った。すなわちタイプ I 型コラーゲンコート 24 穴プレート (SUMILON) に TP-17 の CD ラット (日本チャールズリバー) より調製したラット初代神経細胞を B27 含 Neurobasal 培地 (NB 培地: GIBCO) に懸濁した後、25 万個/well で播種し 3 日間培養した。(i) 上記培養細胞に最終濃度 100 nM となるよう ツニカマイシン (Tnc) を添加し、(ii) 上記培養細胞に最終濃度 2 nM となるよう タプシガーギン (Thap) を添加し、または (iii) 上記培養細胞を、グルコースを含まない B27 含 NB 培地で 2 回培地交換した後、3 mM となるよう 2-デオキシグルコース (2DG) を添加し、それぞれ 4、8 および 24 時間後に細胞より RNeasy Mini kit (キアゲン) を用いて実験手引き書に従い total RNA を抽出した。対照として上記薬剤 (Tnc、Thap および 2DG) の代わりに、各培地を添加した細胞 (薬剤非添加細胞) を用いた。これらを材料として oligonucleotide microarray (Rat Genome U34A; Affymetrix 社) を用いて遺伝子発現解析を行った。

実験方法は、Affymetrix 社の実験手引き書 (Expression analysis technical manual) に従った。各薬剤で刺激した細胞と非添加の細胞の遺伝子発現 profile を比較した結果、Neuronal cell death inducible putative kinase (NIPK) 遺伝子が、各小胞体ストレス刺激 [上記 (i)、(ii) および (iii)] により発現亢進していた (表 1)。

【0075】

【表 1】

細胞	遺伝子発現量 ^a
ツニカイン刺激 4 時間後	0.41
非刺激 4 時間後	ND
ツニカイン刺激 8 時間後	1.64
非刺激 8 時間後	ND
ツニカイン 24 時間後	1.32
非刺激 24 時間後	ND
ツブシカイン刺激 4 時間後	0.93
非刺激 4 時間後	ND
ツブシカイン 8 時間後	2.70
非刺激 4 時間後	ND
ツブシカイン刺激 24 時間後	1.64
非刺激 24 時間後	ND
2 D G 添加 4 時間後	0.72
非刺激 4 時間後	ND
2 D G 添加 8 時間後	1.79
非刺激 8 時間後	ND
2 D G 添加 24 時間後	2.45
非刺激 24 時間後	ND

^a 遺伝子発現量は、oligonucleotide microarray で発現が検出された presence を示す遺伝子の発現量の中央値を 1 として標準化した。

ND; not detected

【0076】

実施例 2

小胞体ストレスにより発現亢進した N I P K 遺伝子の発現に β アミロイド刺激が影響を与えるか否かを検討する目的で、 β アミロイド刺激した細胞を用いて実施例 1 と同様に遺伝子発現解析を行なった。

すなわち、実施例 1 と同様に調製したラット初代神経細胞を N 2 含 DMEM 培地 (GIBCO) に懸濁した後、25 万個/well で播種し 3 日間培養した。培養後、最終濃度 25 μ M となるよう上記培地で懸濁した β アミロイドを添加し、4、8、24 時間後に実施例 1 と同様に、細胞より total RNA を抽出し、遺伝子解析を行なった。対照には β アミロイドの代わりに上記培地を添加した細胞を用いた。対

照と比較して、 β アミロイドで刺激した細胞でNIPKの発現が亢進していた（表2）。

【0077】

【表2】

細胞	遺伝子発現量 ^a
β アミロイド 刺激 4 時間後	ND
非刺激 4 時間後	ND
β アミロイド 刺激 8 時間後	ND
非刺激 8 時間後	ND
β アミロイド 刺激 24 時間後	0.34
非刺激 24 時間後	ND

^a遺伝子発現量は、oligonucleotide microarray で発現が検出された presence を示す遺伝子の発現量の中央値を 1 として標準化した。

【0078】

実施例 3

NIPKが細胞死に与える影響を検討する目的で、一過性形質導入を用いてNIPK遺伝子発現細胞を作製し、細胞死誘導系に供した。

すなわち、ヒト神経芽細胞腫SK-N-AS細胞（ATCCより購入）に最終濃度500 ng/mlとなるようツニカマイシンを添加し8時間培養した。培養後、ISOGEN（ニッポンジーン）を用いてtotal RNAを抽出した。得られたtotal RNAを鋳型としてRNA PCR kit（TAKARA）を用いて逆転写反応を行なった。ヒトNIPK遺伝子の増幅のため、合成プライマー（配列番号：3および配列番号：4）と、酵素としてPfu turbo（ストラタジーン）を用い、以下の（1）～（5）の条件でPCRを行ない、特異的なPCR産物を得た。

- (1) 95℃ 1分
- (2) 95℃ 20秒－68℃ 15秒－72℃ 1分を3回
- (3) 95℃ 20秒－66℃ 15秒－72℃ 1分を3回
- (4) 95℃ 20秒－64℃ 15秒－72℃ 1分を35回
- (5) 72℃ 5分

得られたPCR産物を、pCDNA3.1-/V5-His TOP0（インビトロジェン）へクローニ

ングし、大腸菌DH5 α を形質転換した。得られたコロニーをLB培地で培養し、QUAGEN plasmid midi kit (キアゲン) を用いてベクターを回収した。このNIPK遺伝子発現ベクターをNucleofector (AMAXA) を用い、SK-N-AS細胞へ形質導入した。対照としてpCDNA3.1をSK-N-AS細胞へ形質導入した。

各形質導入細胞をタイプIコラーゲンコート96穴プレート (IWAKI) へ7500個/ウェルで播種し、1晩培養後、ツニカマイシンまたはタプシガーギンを種々の濃度で添加し、1日または2日間培養し細胞死を誘導した。培養後、細胞死に伴うDNA切断を、CELL DEATH DETECTION ELISA PLUS kit (ロッシュ) を用い検出した。実験方法は、キットに添付された実験手引き書に従った。

結果を図1～図4に示す。

pCDNA3.1形質導入SK-N-AS細胞 (対照細胞) と比較して、ヒトNIPK遺伝子形質導入細胞ではDNA切断が亢進した。これより、NIPKが細胞死促進作用を有することが明らかである。

【0079】

【発明の効果】

本発明のタンパク質およびポリヌクレオチドは、例えば神経変性疾患〔例、アルツハイマー病 (家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など)、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの診断マーカー等として有用であり、該タンパク質、ポリヌクレオチドまたは該タンパク質に対する抗体などを用いるスクリーニングにより得られる調節剤、該タンパク質に対する中和抗体などは、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病 (家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など)、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など〕などの予防・治療剤として使用することができる。

また、本発明のアンチセンスポリヌクレオチドは、本発明のタンパク質の発現を抑制することができ、例えば、神経変性疾患〔例、アルツハイマー病 (家族性

アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など)、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など]などの疾病の予防・治療剤として使用することができる。さらに、本発明の各種のポリヌクレオチドは例えば神経変性疾患[例、アルツハイマー病(家族性アルツハイマー病、若年性アルツハイマー病、孤発性アルツハイマー病など)、パーキンソン病、ダウン症、筋萎縮性側索硬化症、プリオン病、クロイツフェルトーヤコブ病、ハンチントン舞踏病、糖尿病性ニューロパチー、多発性硬化症など]などの診断、予防または治療に有用である。

【0080】

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> Takeda Chemical Industries, Ltd.

<120> Preventing and treating agent for neurodegenerative disease

<130> B02304

<160> 20

<210> 1

<211> 358

<212> PRT

<213> Human

<400> 1

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys

5

10

15

Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln

20

25

30

Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu

35

40

45

Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr

50

55

60

Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly
65 70 75 80
Arg Ala Tyr Gln Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys
85 90 95
Lys Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Leu Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala
100 105 110
Arg Leu Pro Pro His Lys His Val Ala Arg Pro Thr Glu Val Leu Ala
115 120 125
Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Arg Thr His Gly Asp Met
130 135 140
His Ser Leu Val Arg Ser Arg His Arg Ile Pro Glu Pro Glu Ala Ala
145 150 155 160
Val Leu Phe Arg Gln Met Ala Thr Ala Leu Ala His Cys His Gln His
165 170 175
Gly Leu Val Leu Arg Asp Leu Lys Leu Cys Arg Phe Val Phe Ala Asp
180 185 190
Arg Glu Arg Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser Cys Val
195 200 205
Leu Thr Gly Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys Pro Ala
210 215 220
Tyr Val Gly Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser Gly Lys
225 230 235 240
Ala Ala Asp Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met Leu Ala
245 250 255
Gly His Tyr Pro Phe Gln Asp Ser Glu Pro Val Leu Leu Phe Gly Lys
260 265 270
Ile Arg Arg Gly Ala Tyr Ala Leu Pro Ala Gly Leu Ser Ala Pro Ala
275 280 285
Arg Cys Leu Val Arg Cys Leu Leu Arg Arg Glu Pro Ala Glu Arg Leu

290 295 300
 Thr Ala Thr Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met
 305 310 315 320
 Pro Leu Ala Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val
 325 330 335
 Pro Asp Gly Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg
 340 345 350
 Glu Val Val Leu Tyr Gly
 355

<210> 2

<211> 1074

<212> DNA

<213> Human

<400> 2

atgcgagcca cccctctggc tgctcctgcg ggttcctgt ccaggaagaa gcggttggag 60
 ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag 120
 cccagactgc cccctgcct gttgcccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact 180
 gctgtggcca ctgcctcccg tcttgggccc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcggg 240
 cgggcctacc aggccctgca ctgccctaca ggactgagt atacctgcaa ggtgtacccc 300
 gtccaggaag ccctggccgt gctggagccc tatgcgcggc tgcccccgca caagcatgtg 360
 gctcggccca ctgaggctct ggctgggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc 420
 catggggaca tgcacagcct ggtgcgaagc cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc 480
 gtgctcttcc gccagatggc caccgccctg gcgcactgtc accagcacgg tctggctctg 540
 cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg agaggaagaa gctggtgctg 600
 gagaacctgg aggactcctg cgtgctgact gggccagatg attccctgtg ggacaagcac 660
 gcgtgcccag cctacgtggg acctgagata ctacagctcac gggcctcata ctcgggcaag 720
 gcagccgatg tctggagcct gggcgtggcg ctcttcacca tgctggccgg ccactacccc 780
 ttccaggact cggagcctgt cctgctcttc ggcaagatcc gccgcggggc ctacgccttg 840

cctgcaggcc tctcggcccc tgcccgtgt ctggttcgct gcctccttcg tcgggagcca 900
gctgaacggc tcacagccac aggcacctc ctgcaccct ggctgcgaca ggacccgatg 960
cccttagccc caaccgata ccatctctgg gaggtgccc aggtggtccc tgatggactg 1020
gggctggacg aagccaggga agaggaggga gacagagaag tggttctgta tggc 1074

<210> 3

<211> 32

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Primer

<400> 3

gccatgcgag ccacccctct ggctgctcct gc 32

<210> 4

<211> 28

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Primer

<400> 4

cctagccata cagaaccact tctctgtc 28

<210> 5

<211> 1074

<212> DNA

<213> Human

<400> 5

atgcgagcca cccctctagc tgctcctgcg ggttcctgt ccaggaagaa gcggttgag 60

ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag 120
 cccagactgc cccctgcct gttgcccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact 180
 gctgtggcca ctgcctcccg tcttgggccc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcggg 240
 cgggcctacc aggccttgca ctgccctaca ggcactgagt atacctgcaa ggtgtacccc 300
 gtccaggaag ccccgccgt gctggagccc tatgcgcggc tgccccgca caagcatgtg 360
 gctcggccca ctgaggctct ggctgggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc 420
 catggggaca tgcacagcct ggtgcgaagc cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc 480
 gtgctcttcc gccagatggc caccgccctg gcgcactgtc accagcacgg tctggctctg 540
 cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg agaggaagaa gctgggtgtg 600
 gagaacctgg aggactcctg cgtgctgact gggccagatg attccctgtg ggacaagcac 660
 gcgtgcccag cctacgtggg acctgagata ctcagctcac gggcctcata ctcgggcaag 720
 gcagccgatg tctggagcct gggcgtggcg ctcttcacca tgctggccgg ccactacccc 780
 ttccaggact cggagcctgt cctgctcttc ggcaagatcc gccgcggggc ctacgccttg 840
 cctgcaggcc tctcggtccc tgcccgtgt ctggttcgct gcctccttcg tcgggagcca 900
 gctgaacggc tcacagccac aggcatactc ctgcaccctt ggctgcgaca ggaccgatg 960
 cccttagccc caaccgatc ccatctctgg gaggtgccc aggtggtccc tgatggtctg 1020
 gggctggacg aagccaggga agaggaggga gacagagaag tggttctgta tggc 1074

<210> 6

<211> 358

<212> PRT

<213> Human

<400> 6

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys

5

10

15

Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln

20

25

30

Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu

35

40

45

Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr
 50 55 60
 Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly
 65 70 75 80
 Arg Ala Tyr Gln Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys
 85 90 95
 Lys Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Pro Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala
 100 105 110
 Arg Leu Pro Pro His Lys His Val Ala Arg Pro Thr Glu Val Leu Ala
 115 120 125
 Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Arg Thr His Gly Asp Met
 130 135 140
 His Ser Leu Val Arg Ser Arg His Arg Ile Pro Glu Pro Glu Ala Ala
 145 150 155 160
 Val Leu Phe Arg Gln Met Ala Thr Ala Leu Ala His Cys His Gln His
 165 170 175
 Gly Leu Val Leu Arg Asp Leu Lys Leu Cys Arg Phe Val Phe Ala Asp
 180 185 190
 Arg Glu Arg Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser Cys Val
 195 200 205
 Leu Thr Gly Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys Pro Ala
 210 215 220
 Tyr Val Gly Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser Gly Lys
 225 230 235 240
 Ala Ala Asp Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met Leu Ala
 245 250 255
 Gly His Tyr Pro Phe Gln Asp Ser Glu Pro Val Leu Leu Phe Gly Lys
 260 265 270
 Ile Arg Arg Gly Ala Tyr Ala Leu Pro Ala Gly Leu Ser Ala Pro Ala

275 280 285
 Arg Cys Leu Val Arg Cys Leu Leu Arg Arg Glu Pro Ala Glu Arg Leu
 290 295 300
 Thr Ala Thr Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met
 305 310 315 320
 Pro Leu Ala Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val
 325 330 335
 Pro Asp Gly Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg
 340 345 350
 Glu Val Val Leu Tyr Gly
 355

<210> 7

<211> 1074

<212> DNA

<213> Human

<400> 7

atgcgagcca cccctctagc tgctcctgcg ggttcctgt ccaggaagaa gcggttgag 60
 ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag 120
 cccagactgc ccccctgcct gttgccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact 180
 gctgtggcca ctgcctcccg tcttgggccc tatgtcctcc tggagcccga ggaggcgagg 240
 cgggcctacc gggccctgca ctgcctaca ggcactgagt atacctgcaa ggtgtacccc 300
 gtccaggaag ccccgccgt gctggagccc tatgcgcggc tgccccgca caagcatgtg 360
 gctcggccca ctgaggctct ggctggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc 420
 catggggaca tgcacagcct ggtgcgaagc cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc 480
 gtgctcttcc gccagatggc caccgcctg gcgcactgtc accagcacgg tctggtcctg 540
 cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg agaggaagaa gctggtgctg 600
 gagaacctgg aggactcctg cgtgctgact gggccagatg attccctgtg ggacaagcac 660
 gcgtgcccag cctacgtggg acctgagata ctcagctcac gggcctcata ctcgggcaag 720

gcagccgatg tctggagcct gggcgtggcg ctcttcacca tgctggccgg ccactacccc 780
ttccaggact cggagcctgt cctgctcttc ggcaagatcc gccgcggggc ctacgccttg 840
cctgcaggcc tctcgcccc tgcccgtgt ctggttcgct gcctccttcg tcgggagcca 900
gctgaacggc tcacagccac aggcatactc ctgcaccctt ggctgcgaca ggacccgatg 960
cccttagccc caaccgatc ccatctctgg gaggctgccc aggtggtccc tgatggtctg 1020
gggctggacg aagccagga agaggagga gacagagaag tggttctgta tggc 1074

<210> 8

<211> 358

<212> DNA

<213> Human

<400> 8

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys
5 10 15
Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln
20 25 30
Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu
35 40 45
Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr
50 55 60
Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly
65 70 75 80
Arg Ala Tyr Arg Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys
85 90 95
Lys Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Pro Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala
100 105 110
Arg Leu Pro Pro His Lys His Val Ala Arg Pro Thr Glu Val Leu Ala
115 120 125
Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Arg Thr His Gly Asp Met

130 135 140
His Ser Leu Val Arg Ser Arg His Arg Ile Pro Glu Pro Glu Ala Ala
145 150 155 160
Val Leu Phe Arg Gln Met Ala Thr Ala Leu Ala His Cys His Gln His
165 170 175
Gly Leu Val Leu Arg Asp Leu Lys Leu Cys Arg Phe Val Phe Ala Asp
180 185 190
Arg Glu Arg Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser Cys Val
195 200 205
Leu Thr Gly Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys Pro Ala
210 215 220
Tyr Val Gly Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser Gly Lys
225 230 235 240
Ala Ala Asp Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met Leu Ala
245 250 255
Gly His Tyr Pro Phe Gln Asp Ser Glu Pro Val Leu Leu Phe Gly Lys
260 265 270
Ile Arg Arg Gly Ala Tyr Ala Leu Pro Ala Gly Leu Ser Ala Pro Ala
275 280 285
Arg Cys Leu Val Arg Cys Leu Leu Arg Arg Glu Pro Ala Glu Arg Leu
290 295 300
Thr Ala Thr Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met
305 310 315 320
Pro Leu Ala Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val
325 330 335
Pro Asp Gly Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg
340 345 350
Glu Val Val Leu Tyr Gly
355

<210> 9

<211> 1074

<212> DNA

<213> Human

<400> 9

```
atgcgagcca cccctctggc tgctcctgcg ggttcctgt ccaggaagaa gcggttggag    60
ttgatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag    120
cccagactgc cccctgcct gttgcccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact    180
gctgtggcca ctgcctcccg tcttggggcc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcggg    240
cgggcctacc aggccctgca ctgccctaca ggcaactgagt atacctgcaa ggtgtacccc    300
gtccaggaag ccctggccgt gctggagccc tacgcgcggc tgcccccgca caagcatgtg    360
gctcggccca ctgaggtcct ggctggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc    420
catggggaca tgcacagcct ggtgcgaaac cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc    480
gtgctcttcc gccagatggc caccgccctg gcgcactgtc accagcacgg tctggctcctg    540
cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg agaggaagaa gctgggtgctg    600
gagaacctgg aggactcctg cgtgctgact gggccagatg attccctgtg ggacaagcac    660
gcgtgcccag cctacgtggg acctgagata ctgagctcac gggcctcata ctcgggcaag    720
gcagccgatg tctggagcct gggcgtggcg ctcttcacca tgctggccgg ccactacccc    780
ttccaggact cggagcctgt cctgctcttc ggcaagatcc gccgcggggc ctacgccttg    840
cctgcaggcc tctcggcccc tgcccgtgt ctggttcgct gcctccttcg tcgggagcca    900
gctgaacggc tcacagccac aggcctcctc ctgcaccct ggctgcgaca ggaccgatg    960
cccttagccc caaccgatc ccatctctgg gaggctgccc aggtggtccc tgatggactg   1020
gggctggacg aagccaggga agaggaggga gacagagaag tggttctgta tggc       1074
```

<210> 10

<211> 358

<212> PRT

<213> Human

<400> 10

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys
5 10 15
Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln
20 25 30
Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu
35 40 45
Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr
50 55 60
Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly
65 70 75 80
Arg Ala Tyr Gln Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys
85 90 95
Lys Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Leu Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala
100 105 110
Arg Leu Pro Pro His Lys His Val Ala Arg Pro Thr Glu Val Leu Ala
115 120 125
Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Arg Thr His Gly Asp Met
130 135 140
His Ser Leu Val Arg Thr Arg His Arg Ile Pro Glu Pro Glu Ala Ala
145 150 155 160
Val Leu Phe Arg Gln Met Ala Thr Ala Leu Ala His Cys His Gln His
165 170 175
Gly Leu Val Leu Arg Asp Leu Lys Leu Cys Arg Phe Val Phe Ala Asp
180 185 190
Arg Glu Arg Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser Cys Val
195 200 205
Leu Thr Gly Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys Pro Ala
210 215 220

Tyr Val Gly Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser Gly Lys
 225 230 235 240
 Ala Ala Asp Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met Leu Ala
 245 250 255
 Gly His Tyr Pro Phe Gln Asp Ser Glu Pro Val Leu Leu Phe Gly Lys
 260 265 270
 Ile Arg Arg Gly Ala Tyr Ala Leu Pro Ala Gly Leu Ser Ala Pro Ala
 275 280 285
 Arg Cys Leu Val Arg Cys Leu Leu Arg Arg Glu Pro Ala Glu Arg Leu
 290 295 300
 Thr Ala Thr Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met
 305 310 315 320
 Pro Leu Ala Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val
 325 330 335
 Pro Asp Gly Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg
 340 345 350
 Glu Val Val Leu Tyr Gly
 355

<210> 11

<211> 969

<212> PRT

<213> Human

<400> 11

atgcgagcca cccctttggc tgcttctgcg ggttccctgt ccaggaagaa gcggttggag 60
 ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag 120
 cccagactgc cccctgcct gttgcccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact 180
 gctgtggcca ctgcctcccg tcttgggccc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcggg 240
 cgggcctacc aggccttgca ctgccctaca ggcactgagt atacctgcaa ggtgtacccc 300

gtccaggaag ccctggccgt gctggaaccc tatgcgcggc tgcccccgga caagcatgtg 360
 gcttggccca ctgagggcct ggctggtacc caacttctct acgccttttt cacttggacc 420
 catggggaca tgcacaggct gatagggcac acgccctgtg cgcactgtga ccagacacgg 480
 aagaagctgg tgctggagaa cctggaggac tcctgcgtgc tgactgggcc agatgattcc 540
 ctgtgggaca agcacgcgtg cccagcctac gtgggacctg agatactcag ctcacgggcc 600
 tcatactcgg gcaaggcagc caatgtctgg agcctgggcg tggcgctctt caccatgctg 660
 gccggccact accccttcca ggactcggag cctgtcctgc tcttcggcaa gatccgccgc 720
 ggggcctacg ccttgccctgc aggcctctcg gccctgccc gctgtctggt tcgctgcctc 780
 cttcgtcggg agccagctga acggctcaca gccacaggca tcctcctgca cccctggctg 840
 cgacaggacc cgatgccctt agccccaacc cgatcccatc tctgggaggc tgcccagggtg 900
 gtccctgatg gactggggct ggacgaagcc aggggaagagg agggagacag agaagtgtt 960
 ctgtatggc 969

<210> 12

<211> 323

<212> PRT

<213> Human

<400> 12

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Ser Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys

5

10

15

Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln

20

25

30

Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu

35

40

45

Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr

50

55

60

Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly

65

70

75

80

Arg Ala Tyr Gln Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys

	85	90	95
Lys Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Leu Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala			
100	105	110	
Arg Leu Pro Pro Asp Lys His Val Ala Trp Pro Thr Glu Gly Leu Ala			
115	120	125	
Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Trp Thr His Gly Asp Met			
130	135	140	
His Arg Leu Ile Gly His Thr Pro Cys Ala His Cys Asp Gln Thr Arg			
145	150	155	160
Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser Cys Val Leu Thr Gly			
165	170	175	
Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys Pro Ala Tyr Val Gly			
180	185	190	
Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser Gly Lys Ala Ala Asn			
195	200	205	
Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met Leu Ala Gly His Tyr			
210	215	220	
Pro Phe Gln Asp Ser Glu Pro Val Leu Leu Phe Gly Lys Ile Arg Arg			
225	230	235	240
Gly Ala Tyr Ala Leu Pro Ala Gly Leu Ser Ala Pro Ala Arg Cys Leu			
245	250	255	
Val Arg Cys Leu Leu Arg Arg Glu Pro Ala Glu Arg Leu Thr Ala Thr			
260	265	270	
Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met Pro Leu Ala			
275	280	285	
Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val Pro Asp Gly			
290	295	300	
Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg Glu Val Val			
305	310	315	320

Leu Tyr Gly

<210> 13

<211> 1074

<212> PRT

<213> Human

<400> 13

```
atgcgagcca cccctctggc tgctcctgcg ggttccctgt ccaggaagaa gcggttggag    60
ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag    120
cccagactgc cccctgcct gttgcccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact    180
gctgtggcca ctgcctcccg tcttgggccc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcggg    240
cgggcctacc aggccctgca ctgccctaca ggccactgagt atacctgcag ggtgtacccc    300
gtccaggaag ccctggccgt gctggagccc tatgcgcggc tgcccccgca caagcatgtg    360
gctcggccca ctgaggtcct ggctggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc    420
catggggaca tgcacagcct ggtgcgaagc cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc    480
gtgctcttcc gccagatggc caccgccctg gcgcactgtc accagcacgg tctggtcctg    540
cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg agaggaagaa gctggtgctg    600
gagaacctgg aggactcctg cgtgctgact gggccagatg attccctgtg ggacaagcac    660
gcgtgcccag cctacgtggg acctgagata ctcagctcac gggcctcata ctcgggcaag    720
gcagccgatg tctggagcct gggcgtggcg ctcttcacca tgctggccgg cactacccc    780
ttccaggact cggagcctgt cctgctcttc ggcaagatcc gccgcggggc ctacgccttg    840
cctgcaggcc tctcgcccc tgcccgtgt ctggttcgt gcctccttcg tcgggagcca    900
gctgaacggc tcacagccac aggcacctc ctgcacccct ggctgcgaca ggacccgatg    960
cccttagccc caaccgatc ccatctctgg gaggctgccc aggtggtccc tgatggactg   1020
gggctggacg aagccaggga agaggaggga gacagagaag tggttctgta tggc       1074
```

<210> 14

<211> 358

<212> PRT

<213> Human

<400> 14

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys

5

10

15

Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln

20

25

30

Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu

35

40

45

Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr

50

55

60

Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly

65

70

75

80

Arg Ala Tyr Gln Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys

85

90

95

Arg Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Leu Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala

100

105

110

Arg Leu Pro Pro His Lys His Val Ala Arg Pro Thr Glu Val Leu Ala

115

120

125

Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Arg Thr His Gly Asp Met

130

135

140

His Ser Leu Val Arg Ser Arg His Arg Ile Pro Glu Pro Glu Ala Ala

145

150

155

160

Val Leu Phe Arg Gln Met Ala Thr Ala Leu Ala His Cys His Gln His

165

170

175

Gly Leu Val Leu Arg Asp Leu Lys Leu Cys Arg Phe Val Phe Ala Asp

180

185

190

Arg Glu Arg Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser Cys Val

195

200

205

Leu Thr Gly Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys Pro Ala

210 215 220
 Tyr Val Gly Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser Gly Lys
 225 230 235 240
 Ala Ala Asp Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met Leu Ala
 245 250 255
 Gly His Tyr Pro Phe Gln Asp Ser Glu Pro Val Leu Leu Phe Gly Lys
 260 265 270
 Ile Arg Arg Gly Ala Tyr Ala Leu Pro Ala Gly Leu Ser Ala Pro Ala
 275 280 285
 Arg Cys Leu Val Arg Cys Leu Leu Arg Arg Glu Pro Ala Glu Arg Leu
 290 295 300
 Thr Ala Thr Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met
 305 310 315 320
 Pro Leu Ala Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val
 325 330 335
 Pro Asp Gly Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg
 340 345 350
 Glu Val Val Leu Tyr Gly
 355

<210> 15

<211> 1074

<212> DNA

<213> Human

<400> 15

atgcgagcca cccctctggc tgctcctgcg ggttcctgt ccaggaagaa gcggttggag 60
 ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag 120
 cccagactgc ccccctgcct gttgccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact 180
 gctgtggcca ctgcctcccg tcttggggccc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcgagg 240

cgggcctacc aggccttgca ctgccctaca ggactgagt atacctgcag ggtgtacccc 300
 gtccaggaag ccctggccgt gctggagccc tatgcgcggc tgccccgcga caagcatgtg 360
 gctcggccca ctgaggtcct ggctggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc 420
 catggggaca tgcacagcct ggtgcgaagc cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc 480
 gtgctcttcc gccagatggc caccgccctg gcgcactgtc accagcacgg tctggtcctg 540
 cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg agaggaagaa gctgggtgctg 600
 gagaacctgg aggactcctg cgtgctgact gggccagatg attccctgtg ggacaagcac 660
 gcgtgcccag cctacgtggg acctgagata ctgagctcac gggcctcata ctggggcaag 720
 gcagccgatg tctggagcct gggcgtggcg ctcttcacca tgctggccgg ccactacccc 780
 ttccaggact cggagcctgt cctgctcttc ggcaagatcc gccgcggggc ctacgccttg 840
 cctgcaggcc tctcggcccc tgcccgtgt ctggttcgct gcctccttcg tcgggagcca 900
 gctgaacggc tcacagccac aggcatactc ctgcaccct ggctgcgaca ggacccgatg 960
 cccttagccc caaccgatc ccattctctg gaggtgccc aggtggtccc tgatggactg 1020
 gggctggacg aagccaggga agaggaggga gacagagaag tggttctgta tggc 1074

<210> 16

<211> 358

<212> DNA

<213> Human

<400> 16

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys

5

10

15

Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln

20

25

30

Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu

35

40

45

Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr

50

55

60

Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly

出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 5 5 0 0

Thr Ala Thr Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met
 305 310 315 320
 Pro Leu Ala Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val
 325 330 335
 Pro Asp Gly Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg
 340 345 350
 Glu Val Val Leu Tyr Gly
 355

<210> 17

<211> 1074

<212> DNA

<213> Human

<400> 17

atgcgagcca cccctctggc tgctcctgcg gggtccctgt ccaggaagaa gcggttggag 60
 ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag 120
 cccagactgc cccctgcct gttgcccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact 180
 gctgtggcca ctgcctcccg tcttgggccc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcggg 240
 cgggcctacc aggccctgca ctgccctaca ggccactgagt atacctgcaa ggtgtacccc 300
 gtccaggaag ccctggccgt gctggagccc tatgcgcggc tgcccccgca caagcatgtg 360
 gctcggccca ctgaggctct ggctggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc 420
 catggggaca tgcacagcct ggtgcgaagc cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc 480
 gtgctcttcc gccagatggc caccgccctg gcgcactgtc accagcacgg tctggtcctg 540
 cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg agaggaagaa gctggtgctg 600
 gagaacctgg aggactcctg cgtgctgact gggccagatg attccctgtg ggacaagcac 660
 gcgtgcccag cctacgtggg acctgagata ctcagctcac gggcctcata ctgggcaag 720
 gcagccgatg tctggagcct gggcgtggcg ctcttcacca tgctggccgg ccactacccc 780
 ttccaggact cggagcctgt cctgctcttc ggcaagatcc gccgcggggc ctacgccttg 840
 cctgcaggcc tctcggcccc tgcccgtgt ctggttcgt gcctccttcg tcgggagcca 900

gctgaacggc tcacagccac aggcacccct ctgcaccctt ggctgcgaca ggacccgatg 960
 cccttagccc caaccgata ccatctctgg gaggtgccc aggtgggtccc tgatggactg 1020
 gggctggacg aagccaggga agaggaggga gacagagaag tggttctgta tggc 1074

<210> 18

<211> 358

<212> PRT

<213> Human

<400> 18

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys
 5 10 15
 Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln
 20 25 30
 Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu
 35 40 45
 Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr
 50 55 60
 Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly
 65 70 75 80
 Arg Ala Tyr Gln Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys
 85 90 95
 Lys Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Leu Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala
 100 105 110
 Arg Leu Pro Pro His Lys His Val Ala Arg Pro Thr Glu Val Leu Ala
 115 120 125
 Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Arg Thr His Gly Asp Met
 130 135 140
 His Ser Leu Val Arg Ser Arg His Arg Ile Pro Glu Pro Glu Ala Ala
 145 150 155 160

Val Leu Phe Arg Gln Met Ala Thr Ala Leu Ala His Cys His Gln His
 165 170 175
 Gly Leu Val Leu Arg Asp Leu Lys Leu Cys Arg Phe Val Phe Ala Asp
 180 185 190
 Arg Glu Arg Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser Cys Val
 195 200 205
 Leu Thr Gly Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys Pro Ala
 210 215 220
 Tyr Val Gly Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser Gly Lys
 225 230 235 240
 Ala Ala Asp Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met Leu Ala
 245 250 255
 Gly His Tyr Pro Phe Gln Asp Ser Glu Pro Val Leu Leu Phe Gly Lys
 260 265 270
 Ile Arg Arg Gly Ala Tyr Ala Leu Pro Ala Gly Leu Ser Ala Pro Ala
 275 280 285
 Arg Cys Leu Val Arg Cys Leu Leu Arg Arg Glu Pro Ala Glu Arg Leu
 290 295 300
 Thr Ala Thr Gly Ile Leu Leu His Pro Trp Leu Arg Gln Asp Pro Met
 305 310 315 320
 Pro Leu Ala Pro Thr Arg Ser His Leu Trp Glu Ala Ala Gln Val Val
 325 330 335
 Pro Asp Gly Leu Gly Leu Asp Glu Ala Arg Glu Glu Glu Gly Asp Arg
 340 345 350
 Glu Val Val Leu Tyr Gly
 355

<210> 19

<211> 1080

<212> DNA

<213> Human

<400> 19

```
atgcgagcca cccctctggc tgctcctgcg gggtccctgt ccaggaagaa gcggttggag    60
ttggatgaca acttagatac cgagcgtccc gtccagaaac gagctcgaag tgggccccag    120
cccagactgc cccctgcct gttgcccctg agcccaccta ctgctccaga tcgtgcaact    180
gctgtggcca ctgcctcccg tcttggggccc tatgtcctcc tggagcccga ggagggcggg    240
cgggcctacc aggccctgca ctgccctaca ggcaactgagt atacctgcaa ggtgtacccc    300
gtccaggaag ccctggccgt gctggagccc tatgcgcggg tgccccgcga caagcatgtg    360
gctcggccca ctgaggctct ggctgggtacc cagctcctct acgccttttt cactcggacc    420
catggggaca tgcacagcct ggtgcgaagc cgccaccgta tccctgagcc tgaggctgcc    480
gtgctcttcc gccagatggc caccgccctg gcgcactgtc accagcacgg tctggctcctg    540
cgtgatctca agctgtgtcg ctttgtcttc gctgaccgtg accgtgagaa gaagaagctg    600
gtgctggaga acctggagga ctctgcgtg ctgactgggc cagatgattc cctgtgggac    660
aagcacgctg gccagccta cgtgggacct gagatactca gtcacgggc ctcatactcg    720
ggcaaggcag ccgatgtctg gagcctgggc gtggcgctct tcacatgct ggccggccac    780
tacccttcc aggactcgga gcctgtcctg ctcttcggca agatccgccg cggggcctac    840
gccttgctg caggcctctc ggccccctgcc cgctgtctgg ttcgctgcct ccttcgtcgg    900
gagccagctg aacggctcac agccacaggc atcctcctgc acccctggct gcgacaggac    960
ccgatgccct tagccccaac ccgatcccat ctctgggagg ctgccaggt ggtccctgat   1020
ggactggggc tggacgaagc cagggaagag gagggagaca gagaagtgg tctgtatggc   1080
```

<210> 20

<211> 360

<212> PRT

<213> Human

<400> 20

Met Arg Ala Thr Pro Leu Ala Ala Pro Ala Gly Ser Leu Ser Arg Lys

5

10

15


Lys Arg Leu Glu Leu Asp Asp Asn Leu Asp Thr Glu Arg Pro Val Gln
 20 25 30
 Lys Arg Ala Arg Ser Gly Pro Gln Pro Arg Leu Pro Pro Cys Leu Leu
 35 40 45
 Pro Leu Ser Pro Pro Thr Ala Pro Asp Arg Ala Thr Ala Val Ala Thr
 50 55 60
 Ala Ser Arg Leu Gly Pro Tyr Val Leu Leu Glu Pro Glu Glu Gly Gly
 65 70 75 80
 Arg Ala Tyr Gln Ala Leu His Cys Pro Thr Gly Thr Glu Tyr Thr Cys
 85 90 95
 Lys Val Tyr Pro Val Gln Glu Ala Leu Ala Val Leu Glu Pro Tyr Ala
 100 105 110
 Arg Val Pro Pro His Lys His Val Ala Arg Pro Thr Glu Val Leu Ala
 115 120 125
 Gly Thr Gln Leu Leu Tyr Ala Phe Phe Thr Arg Thr His Gly Asp Met
 130 135 140
 His Ser Leu Val Arg Ser Arg His Arg Ile Pro Glu Pro Glu Ala Ala
 145 150 155 160
 Val Leu Phe Arg Gln Met Ala Thr Ala Leu Ala His Cys His Gln His
 165 170 175
 Gly Leu Val Leu Arg Asp Leu Lys Leu Cys Arg Phe Val Phe Ala Asp
 180 185 190
 Arg Asp Arg Glu Lys Lys Lys Leu Val Leu Glu Asn Leu Glu Asp Ser
 195 200 205
 Cys Val Leu Thr Gly Pro Asp Asp Ser Leu Trp Asp Lys His Ala Cys
 210 215 220
 Pro Ala Tyr Val Gly Pro Glu Ile Leu Ser Ser Arg Ala Ser Tyr Ser
 225 230 235 240
 Gly Lys Ala Ala Asp Val Trp Ser Leu Gly Val Ala Leu Phe Thr Met

【図 4】 タプシガーギン刺激 48 時間後における細胞の DNA 切断量を OD 405-492 で表す図である。図中、縦軸は吸光度を、横軸はタプシガーギンの濃度を示す。—○—は対照細胞における DNA 切断量を、—□—は N I P K 遺伝子形質導入細胞における DNA 切断量を示す。


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 神経変性疾患の予防・治療剤などの提供。

【解決手段】 配列番号：1 で表されるアミノ酸配列と同一もしくは実質的に同一のアミノ酸配列を有するタンパク質の活性を阻害する化合物またはその塩、該タンパク質の遺伝子の発現を阻害する化合物、該タンパク質またはその部分ペプチドをコードするDNAの塩基配列に相補的もしくは実質的に相補的な塩基配列またはその一部を含有するアンチセンスポリヌクレオチド、該タンパク質またはその部分ペプチドに対する抗体などは、神経変性疾患などの予防・治療剤として使用することができる。

【選択図】 なし

特願 2002-269091

出願人履歴情報

識別番号

[000002934]

1. 変更年月日

1992年 1月22日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号

氏 名

武田薬品工業株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.